

## Apéndice

### INVENTARIO DE LA HERPETOFAUNA DE MÉXICO 2021

| TAXÓN (Familias/Géneros)   | NATIVAS / ENDÉMICAS (E)    | (Autoridad, Año)                                    |
|--|----------------------------|---|
| <b>Totales = (57/212)</b>  | <b>Totales = 1,389/871</b> |   |
| <b>A M P H I B I A - Ranas,</b>                                      |                            |   |
| <b>Salamandras, Cecilias (linajes extintos no incluidos) (16/58)</b> |                            |   |
| <b>L I S S A M P H I B I A - Anfibios modernos</b>                   | <b>420/291</b>             |   |
| <b>ANURA - Ranas, sapos (11/37)</b>                                  | <b>257/156</b>             |   |
| <b>FAMILIA BUFONIDAE (3)</b>   | <b>35/14</b>               |   |
| <b>GÉNERO <i>Anaxyrus</i></b>  | <b>11/3</b>                |   |
| <i>A. boreas</i>   |                            | (Baird & Girard, 1852)                              |
| <i>A. californicus</i>   |                            | (Camp, 1915)  |
| <i>A. cognatus</i>   |                            | (Say & James, 1823)                                 |
| <i>A. compactilis</i>  | <b>E</b>                   | (Wiegmann, 1833)                                    |
| <i>A. debilis</i>  |                            | (Girard, 1854)                                      |
| <i>A. kelloggi</i>   | <b>E</b>                   | (Taylor, 1938)                                      |
| <i>A. mexicanus</i>  | <b>E</b>                   | (Brocchi, 1879)                                     |
| <i>A. punctatus</i>  |                            | (Baird & Girard, 1852)                              |
| <i>A. retiformis</i>   |                            | (Sanders & Smith, 1951)                             |
| <i>A. speciosus</i>  |                            | (Girard, 1854)                                      |
| <i>A. woodhousii</i>   |                            | (Girard, 1854)                                      |
| <b>GÉNERO <i>Incilius</i></b>  | <b>23/11</b>               |   |
| <i>I. alvarius</i>   |                            | (Girard, Baird & Emory, 1859)                       |
| <i>I. aurarius</i>   |                            | (Mendelson, Muscay, Sell, Acevedo & Campbell, 2012) |
| <i>I. bocourti</i>   |                            | (Brocchi, 1877)                                     |
| <i>I. campbelli</i>  |                            | (Mendelson, 1997)                                   |
| <i>I. canaliferus</i>  |                            | (Cope, 1877)  |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)               | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                             |
|--|-------------------------|--|
| <i>I. cavifrons</i>                    | E                       | (Firschein, 1950)                            |
| <i>I. coccifer</i>                     |                         | (Cope, 1866)                                 |
| <i>I. cristatus</i>                    | E                       | (Wiegmann, 1833)                             |
| <i>I. cycladen</i>                     | E                       | (Lynch & Smith, 1966)                        |
| <i>I. gemmifer</i>                     | E                       | (Taylor, 1940)                               |
| <i>I. luetkenii</i>                    |                         | (Boulenger, 1891)                            |
| <i>I. macrocristatus</i>               |                         | (Firschein & Smith, 1957)                    |
| <i>I. marmoreus</i>                    | E                       | (Wiegmann, 1833)                             |
| <i>I. mazatlanensis</i>                | E                       | (Taylor, 1940)                               |
| <i>I. mccoyi</i>                       | E                       | (Santos-Barrera & Flores-Villela, 2011)      |
| <i>I. nebulifer</i>                    |                         | (Girard, 1854)                               |
| <i>I. occidentalis</i>                 | E                       | (Camerano, 1879)                             |
| <i>I. perplexus</i>                    | E                       | (Taylor, 1943)                               |
| <i>I. pisinnus</i>                     | E                       | (Mendelson, Williams, Shell & Mulcahy, 2005) |
| <i>I. spiculatus</i>                   | E                       | (Mendelson, 1997)                            |
| <i>I. tacanensis</i>                   |                         | (Smith, 1952)                                |
| <i>I. tutelarius</i>                   |                         | (Mendelson, 1997)                            |
| <i>I. valliceps</i>                    |                         | (Wiegmann, 1833)                             |
| <b>GÉNERO <i>Rhinella</i></b>          | <b>1/0</b>              |  |
| <i>R. horribilis</i>                   |                         | (Linnaeus, 1758)                             |
| <b>FAMILIA CENTROLENIDAE (1)</b>       | <b>1/0</b>              |  |
| <b>GÉNERO <i>Hyalinobatrachium</i></b> | <b>1/0</b>              |  |
| <i>H. viridissimum</i>                 |                         | (Taylor, 1942)                               |
| <b>FAMILIA CRAUGASTORIDAE (1)</b>      | <b>40/26</b>            |  |
| <b>GÉNERO <i>Craugastor</i></b>        | <b>40/26</b>            |  |
| <i>C. alfredi</i>                      |                         | (Boulenger, 1898)                            |
| <i>C. amniscola</i>                    |                         | (Campbell & Savage, 2000)                    |
| <i>C. augusti</i>                      |                         | (Dugès, 1879)                                |
| <i>C. batrachylus</i>                  | E                       | (Taylor, 1940)                               |
| <i>C. berkenbuschii</i>                | E                       | (Peters, 1870)                               |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)   | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <i>C. brocchi</i>          |                         | (Boulenger, 1882)                 |
| <i>C. decoratus</i>        | E                       | (Taylor, 1942)                    |
| <i>C. galacticorhinus</i>  | E                       | (Canseco-Márquez & Smith, 2004)   |
| <i>C. glaucus</i>          | E                       | (Lynch, 1967)                     |
| <i>C. greggi</i>           |                         | (Bumhazahem, 1955)                |
| <i>C. guerreroensis</i>    | E                       | (Lynch, 1967)                     |
| <i>C. hobartsmithi</i>     | E                       | (Taylor, 1937)                    |
| <i>C. laticeps</i>         |                         | (Dumeril, 1853)                   |
| <i>C. lineatus</i>         |                         | (Brocchi, 1879)                   |
| <i>C. loki</i>             |                         | (Shannon & Werler, 1955)          |
| <i>C. matudai</i>          |                         | (Taylor, 1941)                    |
| <i>C. megalotympanum</i>   | E                       | (Shannon & Werler, 1955)          |
| <i>C. mexicanus</i>        | E                       | (Brocchi, 1877)                   |
| <i>C. montanus</i>         | E                       | (Taylor, 1942)                    |
| <i>C. occidentalis</i>     | E                       | (Taylor, 1941)                    |
| <i>C. omiltemanus</i>      | E                       | (Günther, 1900)                   |
| <i>C. palenque</i>         |                         | (Campbell, Savage, 2000)          |
| <i>C. pelorus</i>          | E                       | (Campbell, Savage, 2000)          |
| <i>C. polymniae</i>        | E                       | (Campbell, Lamar & Hillis, 1989)  |
| <i>C. pozo</i>             | E                       | (Johnson & Savage, 1995)          |
| <i>C. psephosypharus</i>   |                         | (Campbell, Savagem & Meyer, 1994) |
| <i>C. pygmaeus</i>         |                         | (Taylor, 1937)                    |
| <i>C. rhodopis</i>         | E                       | (Cope, 1867)                      |
| <i>C. rugulosus</i>        | E                       | (Cope, 1870)                      |
| <i>C. rupinius</i>         |                         | (Campbell & Savage, 2000)         |
| <i>C. saltator</i>         | E                       | (Taylor, 1965)                    |
| <i>C. silvicola</i>        | E                       | (Lynch, 1967)                     |
| <i>C. spatulatus</i>       | E                       | (Smith, 1939)                     |
| <i>C. stuarti</i>          |                         | (Lynch, 1967)                     |
| <i>C. taralhumaraensis</i> | E                       | (Taylor, 1940)                    |
| <i>C. taylori</i>          | E                       | (Lynch, 1966)                     |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)               | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)   |
|--|-------------------------|--|
| <i>C. uno</i>                          | E                       | (Savage, 1984)   |
| <i>C. vocalis</i>                      | E                       | (Taylor, 1940)   |
| <i>C. vulcani</i>                      | E                       | (Shannon & Werler, 1955)   |
| <i>C. yucatanensis</i>                 | E                       | (Lynch, 1965)  |
| <b>FAMILIA</b>                         | <b>33/29</b>            |  |
| <b>ELEUTHERODACTYLIDAE (1)</b>         |                         |  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Eleutherodactylus</i> | <b>36/30</b>            |  |
| <i>E. albolabris</i>                   | E                       | (Taylor, 1943)   |
| <i>E. angustidigitorum</i>             | E                       | (Taylor, 1940)   |
| <i>E. campi</i>                        |                         | (Stejneger, 1915)  |
| <i>E. colimotl</i>                     | E                       | (Grünwald, Reyes-Velasco, Franz-Chávez, Morales-Flores, Ahumada-Carrillo, Jones & Boissinot, 2018) |
| <i>E. cystignathoides</i>              |                         | (Cope, 1977)   |
| <i>E. dennisi</i>                      | E                       | (Lynch, 1970)  |
| <i>E. dilatus</i>                      | E                       | (Davis & Dixon, 1955)  |
| <i>E. erendirae</i>                    | E                       | (Grünwald, Reyes Velasco, Franz-Chávez, Morales-Flores, Ahumada-Carrillo, Jones & Boissinot, 2018) |
| <i>E. erythrochomus</i>                | E                       | (Palacios-Aguilar & Santos-Bibiano, 2020)  |
| <i>E. floresvillei</i>                 | E                       | (Grünwald, Reyes Velasco, Franz Chávez, Morales Flores, Ahumada Carrillo, Jones & Boissinot, 2018) |
| <i>E. grandis</i>                      | E                       | (Dixon, 1957)  |
| <i>E. grunwaldi</i>                    | E                       | (Reyes-Velasco, Ahumada-Carrillo, Burkhardt & Devitt, 2015)  |
| <i>E. guttulatus</i>                   |                         | (Cope, 1879)   |
| <i>E. interorbitalis</i>               | E                       | (Langebartel & Shannon, 1956)  |
| <i>E. jaliscoensis</i>                 | E                       | (Grünwald, Reyes-Velasco, Franz-Chávez, Morales-Flores, Ahumada-Carrillo, Jones & Boissinot, 2018) |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros) | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)   |
|--------------------------|-------------------------|--|
| <i>E. leprus</i>         | E                       | (Cope, 1879)   |
| <i>E. longipes</i>       | E                       | (Baird & Emory, 1869)  |
| <i>E. maculabialis</i>   | E                       | (Grünwald, Reyes-Velasco, Franz-Chávez, Morales-Flores, Ahumada-Carrillo, Rodriguez & Jones, 2021) |
| <i>E. manantlanensis</i> | E                       | (Grünwald, Reyes-Velasco, Franz-Chávez, Morales-Flores, Ahumada-Carrillo, Jones & Boissinot, 2018) |
| <i>E. marnockii</i>      |                         | (Cope, 1878)   |
| <i>E. maurus</i>         | E                       | (Hedges, 1989)   |
| <i>E. modestus</i>       | E                       | (Taylor, 1942)   |
| <i>E. nebulosus</i>      |                         | (Taylor, 1943)   |
| <i>E. nietoi</i>         | E                       | (Grünwald, Reyes-Velasco, Franz-Chávez, Morales-Flores, Ahumada-Carrillo, Jones & Boissinot, 2018) |
| <i>E. nitidus</i>        | E                       | (Peters, 1869)   |
| <i>E. orarius</i>        | E                       | (Dixon, 1957)  |
| <i>E. pallidus</i>       | E                       | (Duellman, 1958)   |
| <i>E. pipilans</i>       |                         | (Taylor, 1940)   |
| <i>E. rubrimaculatus</i> |                         | (Taylor & Smith, 1945)   |
| <i>E. rufescens</i>      | E                       | (Duellman & Dixon, 1959)   |
| <i>E. saxatilis</i>      | E                       | (Webb, 1962)   |
| <i>E. sentinelus</i>     | E                       | (Grünwald, Reyes-Velasco, Franz-Chávez, Morales-Flores, Ahumada-Carrillo, Rodriguez & Jones, 2021) |
| <i>E. syristes</i>       | E                       | (Hoyt, 1965)   |
| <i>E. teretistes</i>     | E                       | (Duellman, 1958)   |
| <i>E. verrucipes</i>     | E                       | (Cope, 1885)   |
| <i>E. verruculatus</i>   | E                       | (Peters, 1870)   |
| <i>E. wixarika</i>       | E                       | (Reyes-Velasco, Ahumada-Carrillo, Burkhardt & Devitt, 2015)  |

FAMILIA HYLIDAE (22)

100/69

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)           | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)   |
|------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>GÉNERO</b> <i>Acris</i>         | <b>1/0</b>              |  |
| <i>A. blanchardi</i>               |                         | (Harper, 1947)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Bromeliohyla</i>  | <b>2/1</b>              |  |
| <i>B. bromeliacia</i>              |                         | (Schmidt, 1933)  |
| <i>B. dendroscarta</i>             | <b>E</b>                | (Taylor, 1940)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Charadrahyla</i>  | <b>10/10</b>            |  |
| <i>C. altipotens</i>               | <b>E</b>                | (Duellman, 1968)   |
| <i>C. chaneque</i>                 | <b>E</b>                | (Duellman, 1961)   |
| <i>C. esperancensis</i>            | <b>E</b>                | (Canseco-Márquez, Ramírez-González & González-Bernal, 2017)                                    |
| <i>C. juanitae</i>                 | <b>E</b>                | (Snyder, 1972)   |
| <i>C. nephila</i>                  | <b>E</b>                | (Mendelson & Campbell, 1999)   |
| <i>C. pinorum</i>                  | <b>E</b>                | (Taylor, 1937)   |
| <i>C. sakbah</i>                   | <b>E</b>                | (Jiménez-Arcos, Calzada-Arciniega, Alfaro-Juantorena, Vázquez-Reyes, Blair & Parra-Olea, 2019) |
| <i>C. taeniopus</i>                | <b>E</b>                | (Günther, 1901)  |
| <i>C. tecuani</i>                  | <b>E</b>                | (Campbell, Blancas-Hernández & Smith, 2009)  |
| <i>C. trux</i>                     | <b>E</b>                | (Adler & Dennis, 1972)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Dendropsophus</i> | <b>4/1</b>              |  |
| <i>D. ebraccatus</i>               |                         | (Cope, 1874)   |
| <i>D. microcephalus</i>            |                         | (Cope, 1886)   |
| <i>D. robertmertensi</i>           |                         | (Taylor, 1937)   |
| <i>D. sartori</i>                  | <b>E</b>                | (Smith, 1951)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Dryophytes</i>    | <b>7/4</b>              |  |
| <i>D. arboricola</i>               | <b>E</b>                | (Taylor, 1941)   |
| <i>D. arenicolor</i>               |                         | (Cope, 1866)   |
| <i>D. euphorbiaceus</i>            | <b>E</b>                | (Günther, 1858)  |
| <i>D. eximus</i>                   | <b>E</b>                | (Baird, 1854)  |
| <i>D. plicatus</i>                 | <b>E</b>                | (Brocchi, 1877)  |
| <i>D. walkeri</i>                  |                         | (Stuart, 1954)   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)             | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)             |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <i>D. wrightorum</i>                 |                         | (Taylor, 1939)               |
| <b>GÉNERO</b> <i>Duellmanohyla</i>   | <b>3/2</b>              |                              |
| <i>D. chamulae</i>                   | <b>E</b>                | (Duellman, 1961)             |
| <i>D. ignicolor</i>                  | <b>E</b>                | (Duellman, 1961)             |
| <i>D. schmidtorum</i>                |                         | (Stuart, 1954)               |
| <b>GÉNERO</b> <i>Ecnomiohyla</i>     | <b>2/2</b>              |                              |
| <i>E. echinata</i>                   | <b>E</b>                | (Duellman, 1962)             |
| <i>E. valencifer</i>                 | <b>E</b>                | (Firschein & Smith, 1956)    |
| <b>GÉNERO</b> <i>Exerodonta</i>      | <b>7/7</b>              |                              |
| <i>E. abdivita</i>                   | <b>E</b>                | (Campbell & Duellman, 2000)  |
| <i>E. bivocata</i>                   | <b>E</b>                | (Duellman & Hoyt, 1961)      |
| <i>E. chimalapa</i>                  | <b>E</b>                | (Mendelson & Campbell, 1994) |
| <i>E. melanomma</i>                  | <b>E</b>                | (Taylor, 1940)               |
| <i>E. smaragdina</i>                 | <b>E</b>                | (Taylor, 1940)               |
| <i>E. sumichrasti</i>                | <b>E</b>                | (Brocchi, 1879)              |
| <i>E. xera</i>                       | <b>E</b>                | (Mendelson & Campbell, 1994) |
| <b>GÉNERO</b> <i>Hyliola</i>         | <b>3/0</b>              |                              |
| <i>H. cadaverina</i>                 |                         | (Cope, 1866)                 |
| <i>H. hypochondriaca</i>             |                         | (Hallowell, 1854)            |
| <i>H. regilla</i>                    |                         | (Baird & Girard, 1852)       |
| <b>GÉNERO</b> <i>Megastomatohyla</i> | <b>4/4</b>              |                              |
| <i>M. mixe</i>                       | <b>E</b>                | (Duellman, 1965)             |
| <i>M. mixomaculata</i>               | <b>E</b>                | (Taylor, 1950)               |
| <i>M. nubicola</i>                   | <b>E</b>                | (Duellman, 1964)             |
| <i>M. pellita</i>                    | <b>E</b>                | (Duellman, 1968)             |
| <b>GÉNERO</b> <i>Plectrohyla</i>     | <b>9/2</b>              |                              |
| <i>P. acanthodes</i>                 |                         | (Duellman & Campbell, 1992)  |
| <i>P. avia</i>                       |                         | (Stuart, 1952)               |
| <i>P. guatemalensis</i>              |                         | (Brocchi, 1877)              |
| <i>P. hartwegi</i>                   |                         | (Duellman, 1968)             |
| <i>P. ixil</i>                       |                         | (Stuart, 1942)               |
| <i>P. lacertosa</i>                  | <b>E</b>                | (Bumhazem & Smith, 1954)     |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)          | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)   |
|-----------------------------------|-------------------------|--|
| <i>P. matudai</i>                 |                         | (Hartweg, 1941)  |
| <i>P. pycnochila</i>              | E                       | (Rabb, 1959)   |
| <i>P. sagorum</i>                 |                         | (Hartweg, 1941)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Pseudacris</i>   | <b>1/0</b>              |  |
| <i>P. clarkii</i>                 |                         | (Baird, 1854)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Ptychohyla</i>   | <b>4/2</b>              |  |
| <i>P. euthysanota</i>             |                         | (Kellogg, 1923)  |
| <i>P. leonardschultzei</i>        | E                       | (Ahl, 1934)  |
| <i>P. macrotympanum</i>           |                         | (Tanner, 1957)   |
| <i>P. zaphodes</i>                | E                       | (Campbell & Duellman, 2000)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Quilticohyla</i> | <b>3/3</b>              |  |
| <i>Q. acrochorda</i>              | E                       | (Campbell & Duellman, 2000)  |
| <i>Q. erythromma</i>              | E                       | (Taylor, 1937)   |
| <i>Q. zoque</i>                   | E                       | (Canseco-Márquez, Aguilar-López, Luría-Manzano, Pineda-Arredondo & Caviedes-Solis, 2017) |
| <b>GÉNERO</b> <i>Rheohyla</i>     | <b>1/1</b>              |  |
| <i>R. miotympanum</i>             | E                       | (Cope, 1863)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Sarcohyla</i>    | <b>26/26</b>            |  |
| <i>S. ameibothalame</i>           | E                       | (Canseco-Márquez, Mendelson & Guitérrez-Mayén, 2002)                                     |
| <i>S. arborescandens</i>          | E                       | (Taylor, 1939)   |
| <i>S. bistincta</i>               | E                       | (Cope, 1877)   |
| <i>S. calvicollina</i>            | E                       | (Toal, 1994)   |
| <i>S. celata</i>                  | E                       | (Toal & Mendelson, 1995)   |
| <i>S. cembra</i>                  | E                       | (Caldwell, 1974)   |
| <i>S. charadricola</i>            | E                       | (Duellman, 1964)   |
| <i>S. chryses</i>                 | E                       | (Adler, 1965)  |
| <i>S. crassa</i>                  | E                       | (Brocchi, 1877)  |
| <i>S. cyanomma</i>                | E                       | (Caldwell, 1974)   |
| <i>S. cyclada</i>                 | E                       | (Campbell & Duellman, 2000)  |
| <i>S. floresi</i>                 | E                       | (Kaplan, Heimes & Aguilar, 2020)   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)         | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)  |
|----------------------------------|-------------------------|---|
| <i>S. hapsa</i>                  | E                       | (Campbell, Brodie, Caviedes-Solis, Nieto-Montes de Oca, Luja, Flores-Villela, García-Vázquez, Sarker & Wostl, 2018) |
| <i>S. hazelae</i>                | E                       | (Taylor, 1940)  |
| <i>S. labeculata</i>             | E                       | (Shannon, 1951)   |
| <i>S. labedactyla</i>            | E                       | (Mendelson & Toal, 1996)  |
| <i>S. miahuatlanensis</i>        | E                       | (Meik, Smith, Canseco-Márquez & Campbell, 2006)   |
| <i>S. mykter</i>                 | E                       | (Adler & Dennis, 1972)  |
| <i>S. pachyderma</i>             | E                       | (Taylor, 1942)  |
| <i>S. pentheter</i>              | E                       | (Adler, 1965)   |
| <i>S. psarosema</i>              | E                       | (Campbell & Duellman, 2000)   |
| <i>S. robertsorum</i>            | E                       | (Taylor, 1940)  |
| <i>S. sabrina</i>                | E                       | (Caldwell, 1974)  |
| <i>S. siopela</i>                | E                       | (Duellman, 1968)  |
| <i>S. thorectes</i>              | E                       | (Adler, 1965)   |
| <i>S. toyota</i>                 | E                       | (Grünwald, Franz-Chávez, Morales-Flores, Ahumada-Carrillo & Jones, 2019)  |
| <b>GÉNERO <i>Scinax</i></b>      | <b>1/0</b>              |   |
| <i>S. staufferi</i>              |                         | (Cope, 1865)  |
| <b>GÉNERO <i>Smilisca</i></b>    | <b>4/1</b>              |   |
| <i>S. baudinii</i>               |                         | (Duméril & Bibron, 1841)  |
| <i>s. cyanosticta</i>            |                         | (Smith, 1953)   |
| <i>S. dentata</i>                | E                       | (Smith, 1957)   |
| <i>S. fodiens</i>                |                         | (Boulenger, 1882)   |
| <b>GÉNERO <i>Tlalocohyla</i></b> | <b>4/2</b>              |   |
| <i>T. godmani</i>                | E                       | (Günther, 1901)   |
| <i>T. loquax</i>                 |                         | (Gaige & Stuart, 1934)  |
| <i>T. picta</i>                  |                         | (Günther, 1901)   |
| <i>T. smithii</i>                | E                       | (Boulenger, 1902)   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)                        | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)     |
|---|-------------------------|----------------------|
| <b>GÉNERO</b> <i>Trachycephalus</i>             | <b>1/0</b>              |                      |
| <i>T. vermiculatus</i>                          |                         | (Cope, 1877)         |
| <b>GÉNERO</b> <i>Triprion</i>                   | <b>3/1</b>              |                      |
| <i>T. petasatus</i>                             |                         | (Cope, 1865)         |
| <i>T. spatulatus</i>                            | <b>E</b>                | (Günther, 1882)      |
| <i>T. spinosus</i>                              |                         | (Steindachner, 1864) |
| <b>FAMILIA LEPTODACTYLIDAE</b>                  | <b>3/0</b>              |                      |
| (2)   |                         |                      |
| <b>GÉNERO</b> <i>Engystomops</i>                | <b>1/0</b>              |                      |
| <i>E. pustulosus</i>                            |                         | (Cope, 1864)         |
| <b>GÉNERO</b> <i>Leptodactylus</i>              | <b>2/0</b>              |                      |
| <i>L. fragilis</i>                              |                         | (Brocchi, 1877)      |
| <i>L. melanotus</i>                             |                         | (Hallowell, 1861)    |
| <b>FAMILIA MICHOHYLIDAE (2)</b>                 | <b>6/0</b>              |                      |
| <b>GÉNERO</b> <i>Gastrophryne</i>               | <b>3/0</b>              |                      |
| <i>G. elegans</i>                               |                         | (Boulenger, 1882)    |
| <i>G. mazatlanensis</i>                         |                         | (Taylor, 1943)       |
| <i>G. olivacea</i>                              |                         | (Hallowell, 1856)    |
| <b>GÉNERO</b> <i>Hypopachus</i>                 | <b>3/0</b>              |                      |
| <i>H. barbieri</i>                              |                         | (Schmidt, 1939)      |
| <i>H. ustus</i>                                 |                         | (Cope, 1866)         |
| <i>H. variolosus</i>                            |                         | (Cope, 1866)         |
| <b>FAMILIA PHYLLOMEDUSIDAE</b>                  | <b>3/1</b>              |                      |
| (1)   |                         |                      |
| <b>GÉNERO</b> <i>Agalychnis</i>                 | <b>3/1</b>              |                      |
| <i>A. dacnicolor</i>                            | <b>E</b>                | (Cope, 1864)         |
| <i>A. moreletti</i>                             |                         | (Duméril, 1853)      |
| <i>A. taylori</i>                               |                         | (Funkhouser, 1957)   |
| <b>FAMILIA RANIDAE (1)</b>                      | <b>28/16</b>            |                      |
| <b>GÉNERO</b> <i>Lithobates</i> ( <i>Rana</i> ) | <b>28/16</b>            |                      |
| <i>L. berlandieri</i>                           |                         | (Baird, 1859)        |
| <i>L. brownorum</i>                             |                         | (Sanders, 1973)      |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)           | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)  |
|------------------------------------|-------------------------|---|
| <i>L. catesbeianus</i>             |                         | (Shaw, 1802)  |
| <i>L. chichicuahutla</i>           | E                       | (Cuellar, Mendez-de la Cruz & Villagran-Santa Cruz, 1996) |
| <i>L. chiricahuensis</i>           |                         | (Platz & Mecham, 1979)                                    |
| <i>L. dunnii</i>                   | E                       | (Zweifel, 1957)   |
| <i>L. forreri</i>                  |                         | (Boulenger, 1883)   |
| <i>L. johnii</i>                   | E                       | (Blair, 1965)   |
| <i>L. lemosespinali</i>            | E                       | (Smith & Chiszar, 2003)                                   |
| <i>L. macroglossa</i>              |                         | (Brocchi, 1877)   |
| <i>L. maculata</i>                 |                         | (Brocchi, 1877)   |
| <i>L. magnaocularis</i>            | E                       | (Frost & Bagnara, 1976)                                   |
| <i>L. megapoda</i>                 | E                       | (Taylor, 1942)  |
| <i>L. montezumae</i>               | E                       | (Baird, 1854)   |
| <i>L. neovolcanicus</i>            | E                       | (Hillis & Frost, 1985)                                    |
| <i>L. omiltemana</i>               | E                       | (Günther, 1900)   |
| <i>L. psilonota</i>                | E                       | (Webb, 2001)  |
| <i>L. pueblae</i>                  | E                       | (Zweifel, 1955)   |
| <i>L. pustulosus</i>               | E                       | (Boulenger, 1883)   |
| <i>L. sierramadrensis</i>          | E                       | (Taylor, 1939)  |
| <i>L. spectabilis</i>              | E                       | (Hillis & Frost, 1985)                                    |
| <i>L. tarahumarae</i>              |                         | (Boulenger, 1917)   |
| <i>L. tlaloci</i>                  | E                       | (Hillis & frost, 1985)                                    |
| <i>L. vaillanti</i>                |                         | (Brocchi, 1877)   |
| <i>L. yavapaiensis</i>             |                         | (Platz & Frost, 1984)                                     |
| <i>L. zweifeli</i>                 | E                       | (Hillis, Frost & Webb, 1984)                              |
| <i>L. boylii</i>                   |                         | (Baird, 1854)   |
| <i>L. draytonii</i>                |                         | (Baird & Girard, 1852)                                    |
| <b>FAMILIA RHINOPHYRNIDAE (1)</b>  | <b>1/0</b>              |   |
| <b>GÉNERO <i>Rhinophryalus</i></b> | <b>1/0</b>              |   |
| <i>R. dorsalis</i>                 |                         | (Duméril & Bibron, 1841)                                  |
| <b>FAMILIA SCAPHIOPODIDAE (2)</b>  | <b>4/0</b>              |   |
| <b>GÉNERO <i>Scaphiopus</i></b>    | <b>1/0</b>              |   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)                                 | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                 |
|--|-------------------------|----------------------------------|
| <i>S. couchii</i>  |                         | (Baird, 1854)                    |
| <b>GÉNERO Spea</b>                                       | <b>3/0</b>              |                                  |
| <i>S. bombifrons</i>                                     |                         | (Cope, 1863)                     |
| <i>S. hammondii</i>                                      |                         | (Baird, 1859)                    |
| <i>S. multiplicata</i>                                   |                         | (Cope, 1863)                     |
| <b>CAUDATA - Salamandras, ajolotes y tritones (4/19)</b> | <b>160/134</b>          |                                  |
| <b>FAMILIA AMBYSTOMATIDAE (1)</b>                        | <b>18/17</b>            |                                  |
| <b>GÉNERO Ambystoma</b>                                  | <b>18/17</b>            |                                  |
| <i>A. altamirani</i>                                     | E                       | (Duges, 1895)                    |
| <i>A. amblycephalum</i>                                  | E                       | (Taylor, 1940)                   |
| <i>A. andersoni</i>                                      | E                       | (Krebs & Brandon, 1984)          |
| <i>A. bombycellum</i>                                    | E                       | (Taylor, 1940)                   |
| <i>A. dumerilii</i>                                      | E                       | (Dugès, 1870)                    |
| <i>A. flavipiperatum</i>                                 | E                       | (Dixon, 1963)                    |
| <i>A. granulosum</i>                                     | E                       | (Taylor, 1944)                   |
| <i>A. leorae</i>   | E                       | (Taylor, 1943)                   |
| <i>A. lermaense</i>                                      | E                       | (Taylor, 1940)                   |
| <i>A. mavortium</i>                                      |                         | (Baird, 1850)                    |
| <i>A. mexicanum</i>                                      | E                       | (Shaw, 1789)                     |
| <i>A. ordinarium</i>                                     | E                       | (Taylor, 1940)                   |
| <i>A. rivulare</i>                                       | E                       | (Taylor, 1940)                   |
| <i>A. rosaceum</i>                                       | E                       | (Taylor, 1941)                   |
| <i>A. silvense</i>                                       | E                       | (Webb, 2004)                     |
| <i>A. subsalsum</i>                                      | E                       | (Taylor, 1943)                   |
| <i>A. taylori</i>  | E                       | (Brandon, Maruska & Rumph, 1981) |
| <i>A. velasci</i>  | E                       | (Dugès, 1891)                    |
| <b>FAMILIA PLETHODONTIDAE</b>                            | <b>139/117</b>          |                                  |
| <b>(16)</b>  |                         |                                  |
| <b>GÉNERO Aneides</b>                                    | <b>1/0</b>              |                                  |
| <i>A. lugubris</i>                                       |                         | (Hallowell, 1849)                |
| <b>GÉNERO Aquiloeurycea</b>                              | <b>6/6</b>              |                                  |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)          | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)   |
|-----------------------------------|-------------------------|--|
| <i>A. cafetalera</i>              | E                       | (Parra-Olea, Rovito, Márquez-Valdelmar, Cruz, Murrieta-Galindo & Wake, 2010) |
| <i>A. cephalica</i>               | E                       | (Cope, 1865)   |
| <i>A. galeanae</i>                | E                       | (Taylor, 1941)   |
| <i>A. praecellens</i>             | E                       | (Rabb, 1955)   |
| <i>A. quetzalanensis</i>          | E                       | (Parra-Olea, Canseco-Márquez & Garcia-Paris, 2004)                           |
| <i>A. scandens</i>                | E                       | (Walker, 1955)   |
| <b>GÉNERO <i>Batrachoseps</i></b> | <b>1/0</b>              |  |
| <i>B. major</i>                   |                         | (Camp, 1915)   |
| <b>GÉNERO <i>Bolitoglossa</i></b> | <b>23/10</b>            |  |
| <i>B. alberchi</i>                | E                       | (García-París, Parra-Olea, Brame & Wake, 2000)                               |
| <i>B. chinanteca</i>              | E                       | (Rovito, Parra-Olea, Lee & Wake, 2012)                                       |
| <i>B. coactlahuacana</i>          | E                       | (Aguilar, Cisneros-Bernal, Arias-Montiel & Parra-Olea, 2020)                 |
| <i>B. engelhardti</i>             |                         | (Schmidt, 1936)  |
| <i>B. flavimembris</i>            |                         | (Schmidt, 1936)  |
| <i>B. flaviventris</i>            |                         | (Schmidt, 1936)  |
| <i>B. franklini</i>               |                         | (Schmidt, 1936)  |
| <i>B. hartwegi</i>                |                         | (Wake & Brane, 1969)   |
| <i>B. hermosa</i>                 | E                       | (Papenfuss, Wake & Adler, 1984)  |
| <i>B. lincolni</i>                |                         | (Stuart, 1943)   |
| <i>B. macrinii</i>                | E                       | (Lafrentz, 1930)   |
| <i>B. mexicana</i>                |                         | (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)  |
| <i>B. mulleri</i>                 |                         | (Brocchi, 1883)  |
| <i>B. oaxacensis</i>              | E                       | (Parra-Olea, Garcia-Paris & Wake, 2002)                                      |
| <i>B. occidentalis</i>            |                         | (Taylor, 1941)   |
| <i>B. platydactyla</i>            | E                       | (Gray, 1831)   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)               | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)  |
|--|-------------------------|---|
| <i>B. riletti</i>                      | E                       | (Holman, 1964)  |
| <i>B. rostrata</i>                     |                         | (Brocchi, 1883)   |
| <i>B. rufescens</i>                    |                         | (Cope, 1869)  |
| <i>B. stuarti</i>                      |                         | (Wake & Brame, 1969)  |
| <i>B. veracrucis</i>                   | E                       | (Taylor, 1951)  |
| <i>B. yucatana</i>                     |                         | (Peters, 1882)  |
| <i>B. zapoteca</i>                     | E                       | (Parra-Olea, Garcia-Paris & Wake, 2002)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Bradytriton</i>       | <b>1/0</b>              |   |
| <i>B. silus</i>                        |                         | (Wake & Elias, 1983)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Chiroppterotriton</i> | <b>23/23</b>            |   |
| <i>C. arboreus</i>                     | E                       | (Taylor, 1941)  |
| <i>C. aureus</i>                       | E                       | (García-Castillo, Soto-Pozos, Aguilar-López, Pineda-Arredondo & Parra-Olea, 2018) |
| <i>C. casasi</i>                       | E                       | (Parra-Olea, García-Castillo, Rovito, Maisano, Hanken & Wake, 2020)               |
| <i>C. ceronorum</i>                    | E                       | (Parra-Olea, García-Castillo, Rovito, Maisano, Hanken & Wake, 2020)               |
| <i>C. chico</i>                        | E                       | (García-Castillo, Rovito, Wake & Parra-Olea, 2017)                                |
| <i>C. chiropterus</i>                  | E                       | (Cope, 1863)  |
| <i>C. chondrostega</i>                 | E                       | (Taylor, 1941)  |
| <i>C. cieloensis</i>                   | E                       | (Rovito & Parra-Olea, 2015)   |
| <i>C. cracens</i>                      | E                       | (Rabb, 1958)  |
| <i>C. dimidiatus</i>                   | E                       | (Taylor, 1939)  |
| <i>C. infernalis</i>                   | E                       | (Rovito & Parra-Olea, 2015)   |
| <i>C. lavae</i>                        | E                       | (Taylor, 1942)  |
| <i>C. magnipes</i>                     | E                       | (Rabb, 1965)  |
| <i>C. melipona</i>                     | E                       | (Parra-Olea, García-Castillo, Rovito, Maisano, Hanken & Wake, 2020)               |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)          | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)   |
|-----------------------------------|-------------------------|--|
| <i>C. miquihuanaus</i>            | E                       | (Campbell, Streicher, Cox & Brodie, 2014)  |
| <i>C. mosaueri</i>                | E                       | (Woodall, 1941)  |
| <i>C. multidentatus</i>           | E                       | (Taylor, 1938)   |
| <i>C. nubilus</i>                 | E                       | (García-Castillo, Soto-Pozos, Aguilar-López, Pineda-Arredondo & Parra-Olea, 2018)) |
| <i>C. orculus</i>                 | E                       | (Cope, 1865)   |
| <i>C. perotensis</i>              | E                       | (Parra-Olea, García-Castillo, Rovito, Maisano, Hanken & Wake, 2020)                |
| <i>C. priscus</i>                 | E                       | (Rabb, 1956)   |
| <i>C. terrestris</i>              | E                       | (Taylor, 1941)   |
| <i>C. totonacus</i>               | E                       | (Parra-Olea, García-Castillo, Rovito, Maisano, Hanken & Wake, 2020)                |
| <b>GÉNERO</b> <i>Cryptotriton</i> | <b>1/1</b>              |  |
| <i>C. alvarezdeltoroi</i>         | E                       | (Papenfuss & Wake, 1987)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Dendrotriton</i> | <b>2/2</b>              |  |
| <i>D. megarhinus</i>              | E                       | (Rabb, 1960)   |
| <i>D. xolocalcae</i>              | E                       | (Taylor, 1941)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Ensatina</i>     | <b>1/0</b>              |  |
| <i>E. eschscholtzii</i>           |                         | (Gray, 1850)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Isthmura</i>     | <b>7/7</b>              |  |
| <i>I. bellii</i>                  | E                       | (Gray, 1850)   |
| <i>I. boneti</i>                  | E                       | (Álvarez & Martin, 1967)   |
| <i>I. corrugata</i>               | E                       | (Sandoval-Comte, Pineda-Arredeondo, Rovito & Luría-Manzano, 2017)                  |
| <i>I. gigantea</i>                | E                       | (Taylor, 1939)   |
| <i>I. maxima</i>                  | E                       | (Parra-Olea, García-París, Papenfuss & Wake, 2005)                                 |
| <i>I. naucampatepetl</i>          | E                       | (Parra-Olea, Papenfuss & Wake, 2001)   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)           | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)   |
|------------------------------------|-------------------------|--|
| <i>I. sierraoccidentalis</i>       | E                       | (Lowe, Jones & Wright, 1968)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Ixalotriton</i>   | <b>2/2</b>              |  |
| <i>I. niger</i>                    | E                       | (Wake & Johnson, 1989)   |
| <i>I. parvus</i>                   | E                       | (Lynch & Wake, 1989)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Nyctanolis</i>    | <b>1/0</b>              |  |
| <i>N. pernix</i>                   |                         | (Elias & Wake, 1983)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Oedipina</i>      | <b>1/0</b>              |  |
| <i>O. elongata</i>                 |                         | (Schmidt, 1936)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Parvimolge</i>    | <b>1/1</b>              |  |
| <i>P. townsendi</i>                | E                       | (Dunn, 1922)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Pseudoeurycea</i> | <b>39/36</b>            |  |
| <i>P. ahuitzotl</i>                | E                       | (Adler, 1996)  |
| <i>P. altamontana</i>              | E                       | (Taylor, 1938)   |
| <i>P. amuzga</i>                   | E                       | (Pérez Ramos & Saldaña de la Riva, 2003)   |
| <i>P. anitae</i>                   | E                       | (Bogert, 1967)   |
| <i>P. aquatica</i>                 | E                       | (Wake & Campbell, 2001)  |
| <i>P. aurantia</i>                 | E                       | (Canseco-Márquez & Parra-Olea, 2003)   |
| <i>P. brunnata</i>                 |                         | (Bumhazem & Smith, 1955)   |
| <i>P. cochranae</i>                | E                       | (Taylor, 1943)   |
| <i>P. conanti</i>                  | E                       | (Bogert, 1967)   |
| <i>P. firscheini</i>               | E                       | (Shannon & Werler, 1955)   |
| <i>P. gadovii</i>                  | E                       | (Dunn, 1926)   |
| <i>P. goebeli</i>                  |                         | (Schmidt, 1936)  |
| <i>P. granitum</i>                 | E                       | (García-Bañuelos, Aguilar-López, Kelly-Hernández, Vásquez-Cruz, Pineda-Arredondo & Rovito, 2020) |
| <i>P. juarezi</i>                  | E                       | (Regal, 1966)  |
| <i>P. kuautli</i>                  | E                       | (Campbell, Brodie, Blancas-Hernández & Smith, 2013)  |
| <i>P. leprosa</i>                  | E                       | (Cope, 1869)   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)     | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                                |
|------------------------------|-------------------------|---|
| <i>P. lineola</i>            | E                       | (Cope, 1865)                                    |
| <i>P. longicauda</i>         | E                       | (Lynch, Wake & Yang, 1983)                      |
| <i>P. lynchi</i>             | E                       | (Parra-Olea, Papenfuss & Wake, 2001)            |
| <i>P. melanomolga</i>        | E                       | (Taylor, 1941)                                  |
| <i>P. mixcoatl</i>           | E                       | (Adler, 1996)                                   |
| <i>P. mixteca</i>            | E                       | (Canseco-Márquez & Gutiérrez-Mayén, 2005)       |
| <i>P. mystax</i>             | E                       | (Bogert, 1967)                                  |
| <i>P. nigromaculata</i>      | E                       | (Taylor, 1941)                                  |
| <i>P. obesa</i>              | E                       | (Parra-Olea, Garcia-Paris, Hanken & Wake, 2005) |
| <i>P. orchileucus</i>        | E                       | (Brodie, Mendelson & Campbell, 2002)            |
| <i>P. orchimelas</i>         | E                       | (Brodie, Mendelson & Campbell, 2002)            |
| <i>P. papenfussi</i>         | E                       | (Parra-Olea, Garcia-Paris Hanken & Wake, 2005)  |
| <i>P. rex</i>                |                         | (Dunn, 1921)                                    |
| <i>P. robertsi</i>           | E                       | (Taylor, 1938)                                  |
| <i>P. ruficauda</i>          | E                       | (Parra-Olea, Garcia-Paris, Hanken & Wake, 2004) |
| <i>P. saltator</i>           | E                       | (Lynch & Wake, 1989)                            |
| <i>P. smithi</i>             | E                       | (Taylor, 1938)                                  |
| <i>P. tenchalli</i>          | E                       | (Adler, 1996)                                   |
| <i>P. teotepec</i>           | E                       | (Adler, 1996)                                   |
| <i>P. tlahcuiloh</i>         | E                       | (Adler, 1996)                                   |
| <i>P. tlilicxitl</i>         | E                       | (Lara-Góngora, 2003)                            |
| <i>P. unguidentis</i>        | E                       | (Taylor, 1941)                                  |
| <i>P. werleri</i>            | E                       | (Darling & Smith, 1954)                         |
| <b>GÉNERO <i>Thorius</i></b> | <b>29/29</b>            |   |
| <i>T. adelos</i>             | E                       | (Papenfuss & Wake, 1987)                        |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros) | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)   |
|--------------------------|-------------------------|--|
| <i>T. arboreus</i>       | E                       | (Hanken & Wake, 1994)  |
| <i>T. aureus</i>         | E                       | (Hanken & Wake, 1994)  |
| <i>T. boreas</i>         | E                       | (Hanken & Wake, 1994)  |
| <i>T. dubitus</i>        | E                       | (Taylor, 1941)   |
| <i>T. grandis</i>        | E                       | (Hanken, Wake & Freeman, 1999)                                   |
| <i>T. hankeni</i>        | E                       | (Campbell, Brodie, Flores-Villela & Smith, 2014)                 |
| <i>T. infernalis</i>     | E                       | (Hanken, Wake & Freeman, 1999)                                   |
| <i>T. insperatus</i>     | E                       | (Hanken & Wake, 1994)  |
| <i>T. longicaudus</i>    | E                       | (Parra-Olea, Rovito, García-París, Maisano, Wake & Hanken, 2016) |
| <i>T. lunaris</i>        | E                       | (Hanken & Wake, 1998)  |
| <i>T. macdougalli</i>    | E                       | (Taylor, 1949)   |
| <i>T. magnipes</i>       | E                       | (Hanken & Wake, 1998)  |
| <i>T. maxillabrochus</i> | E                       | (Gehlbach, 1959)   |
| <i>T. minutissimus</i>   | E                       | (Taylor, 1949)   |
| <i>T. minydemus</i>      | E                       | (Hanken & Wake, 1998)  |
| <i>T. munificus</i>      | E                       | (Hanken & Wake, 1998)  |
| <i>T. narismagnus</i>    | E                       | (Shannon & Werler, 1955)   |
| <i>T. narisovalis</i>    | E                       | (Taylor, 1939)   |
| <i>T. omiltemi</i>       | E                       | (Hanken, Wake & Freeman, 1999)                                   |
| <i>T. papaloae</i>       | E                       | (Hanken & Wake, 2001)  |
| <i>T. pennatulus</i>     | E                       | (Cope, 1869)   |
| <i>T. pinicola</i>       | E                       | (Parra-Olea, Rovito, García-París, Maisano, Wake & Hanken, 2016) |
| <i>T. pulmonaris</i>     | E                       | (Taylor, 1939)   |
| <i>T. schmidti</i>       | E                       | (Gehlbach, 1959)   |
| <i>T. smithi</i>         | E                       | (Hanken & Wake, 1994)  |
| <i>T. spilogaster</i>    | E                       | (Hanken & Wake, 1998)  |
| <i>T. tlaxiacus</i>      | E                       | (Parra-Olea, Rovito, García-París, Maisano, Wake & Hanken, 2016) |
| <i>T. troglodytes</i>    | E                       | (Taylor, 1941)   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)                    | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)         |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>FAMILIA SALAMANDRIDAE (1)</b>            | <b>1/0</b>              |                          |
| <b>GÉNERO</b> <i>Notophthalmus</i>          | <b>1/0</b>              |                          |
| <i>N. meridionalis</i>                      |                         | (Cope, 1880)             |
| <b>FAMILIA SIRENIDAE (1)</b>                | <b>2/0</b>              |                          |
| <b>GÉNERO</b> <i>Siren</i>                  | <b>2/0</b>              |                          |
| <i>S. intermedia</i>                        |                         | (Barnes, 1826)           |
| <i>S. lacertina</i>                         |                         | (Österdam, 1766)         |
| <b>GYMNOPHIONA - Cecilias, ápodos (1/2)</b> | <b>3/1</b>              |                          |
| <b>FAMILIA DERMOPHIIDAE (2)</b>             | <b>3/1</b>              |                          |
| <b>GÉNERO</b> <i>Dermophis</i>              | <b>2/1</b>              |                          |
| <i>D. mexicanus</i>                         |                         | (Duméril & Bibron, 1841) |
| <i>D. oaxacae</i>                           | <b>E</b>                | (Mertens, 1930)          |
| <b>GÉNERO</b> <i>Gymnopis</i>               | <b>1/0</b>              |                          |
| <i>G. syntrema</i>                          |                         | (Cope, 1866)             |
| <b>R E P T I L I A -</b>                    | <b>969/579</b>          |                          |
| <b>Reptiles (41/154)</b>                    |                         |                          |
| <b>TESTUDINES - Tortugas (9/18)</b>         | <b>53/20</b>            |                          |
| <b>FAMILIA CHELONIIDAE (4)</b>              | <b>5/0</b>              |                          |
| <b>GÉNERO</b> <i>Caretta</i>                | <b>1/0</b>              |                          |
| <i>C. caretta</i>                           |                         | (Linnaeus, 1758)         |
| <b>GÉNERO</b> <i>Chelonia</i>               | <b>1/0</b>              |                          |
| <i>C. mydas</i>                             |                         | (Linnaeus, 1758)         |
| <b>GÉNERO</b> <i>Eretmochelys</i>           | <b>1/0</b>              |                          |
| <i>E. imbricata</i>                         |                         | (Linnaeus, 1766)         |
| <b>GÉNERO</b> <i>Lepidochelys</i>           | <b>2/0</b>              |                          |
| <i>L. kempii</i>                            |                         | (Garman, 1880)           |
| <i>L. olivacea</i>                          |                         | (Eschscholtz, 1829)      |
| <b>FAMILIA CHELYDRIDAE (1)</b>              | <b>1/0</b>              |                          |
| <b>GÉNERO</b> <i>Chelydra</i>               | <b>1/0</b>              |                          |
| <i>C. rossignonii</i>                       |                         | (Bocourt, 1868)          |
| <b>FAMILIA DERMATEMYDIDAE (1)</b>           | <b>1/0</b>              |                          |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)          | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                  |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>GÉNERO</b> <i>Dermatemys</i>   | <b>1/0</b>              |                                   |
| <i>D. mawii</i>                   |                         | (Gray, 1847)                      |
| <b>FAMILIA DERMOCHELYDAE (1)</b>  | <b>1/0</b>              |                                   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Dermochelys</i>  | <b>1/0</b>              |                                   |
| <i>D. coriacea</i>                |                         | (Vandelli, 1761)                  |
| <b>FAMILIA EMYDIDAE (5)</b>       | <b>17/8</b>             |                                   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Actinemys</i>    | <b>1/0</b>              |                                   |
| <i>A. pallida</i>                 |                         | (Seeliger, 1945)                  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Chrysemys</i>    | <b>1/0</b>              |                                   |
| <i>C. picta</i>                   |                         | (Schneider, 1783)                 |
| <b>GÉNERO</b> <i>Pseudemys</i>    | <b>1/0</b>              |                                   |
| <i>P. gorzugi</i>                 |                         | (Ward, 1984)                      |
| <b>GÉNERO</b> <i>Terrapene</i>    | <b>6/4</b>              |                                   |
| <i>T. carolina</i>                |                         | (Linnaeus, 1758)                  |
| <i>T. coahuila</i>                | <b>E</b>                | (Schmidt & Owens, 1944)           |
| <i>T. mexicana</i>                | <b>E</b>                | (Gray, 1849)                      |
| <i>T. nelsoni</i>                 | <b>E</b>                | (Stejneger, 1925)                 |
| <i>T. ornata</i>                  |                         | (Agassiz, 1857)                   |
| <i>T. yucatana</i>                | <b>E</b>                | (Boulenger, 1895)                 |
| <b>GÉNERO</b> <i>Trachemys</i>    | <b>8/4</b>              |                                   |
| <i>T. gaigeae</i>                 |                         | (Hartweg, 1939)                   |
| <i>T. grayi</i>                   |                         | (Bocourt, 1868)                   |
| <i>T. nebulosa</i>                | <b>E</b>                | (Van Denburgh, 1895)              |
| <i>T. ornata</i>                  | <b>E</b>                | (Gray, 1831)                      |
| <i>T. scripta</i>                 |                         | (Schoepff, 1792)                  |
| <i>T. taylori</i>                 | <b>E</b>                | (Legler, 1960)                    |
| <i>T. venusta</i>                 |                         | (Gray, 1855)                      |
| <i>T. yaquia</i>                  | <b>E</b>                | (Legler & Webb, 1970)             |
| <b>FAMILIA GEOEMYDIDAE (1)</b>    | <b>3/1</b>              |                                   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Rhinoclemmys</i> | <b>3/1</b>              |                                   |
| <i>R. areolata</i>                |                         | (Duméril, Bibron & Duméril, 1851) |
| <i>R. pulcherrima</i>             |                         | (Gray, 1856)                      |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)         | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)   |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| <i>R. rubida</i>                 | E                       | (Cope, 1870)   |
| <b>FAMILIA KINOSTERNIDAE (2)</b> | <b>16/9</b>             |  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Claudius</i>    | <b>1/0</b>              |  |
| <i>C. angustatus</i>             |                         | (Cope, 1865)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Kinosternon</i> | <b>16/9</b>             |  |
| <i>K. acutum</i>                 |                         | (Gray, 1831)   |
| <i>K. alamosae</i>               | E                       | (Berry & Legler, 1980)   |
| <i>K. arizonense</i>             |                         | (Gilmore, 1922)  |
| <i>K. chimalhuaca</i>            | E                       | (Berry, Seidel & Iverson, 1997)  |
| <i>K. cora</i>                   | E                       | (Loc-Barragán, Reyes-Velasco, Woolrich-Piña, Grünwald, Venegas De Anaya, Rangel-Mendoza & López-Luna, 2020)                                  |
| <i>K. creaseri</i>               | E                       | (Hartweg, 1934)  |
| <i>K. durangoense</i>            | E                       | (Iverson, 1979)  |
| <i>K. flavescens</i>             |                         | (Agassiz, 1857)  |
| <i>K. herrerai</i>               | E                       | (Stejneger, 1925)  |
| <i>K. hirtipes</i>               |                         | (Wagler, 1830)   |
| <i>K. integrum</i>               | E                       | (LeConte, 1854)  |
| <i>K. leucostomum</i>            |                         | (Duméril, Bibron & Duméril, 1851)  |
| <i>K. oaxacae</i>                | E                       | (Berry, Iverson, 1980)   |
| <i>K. scorpioides</i>            |                         | (Linnaeus, 1766)   |
| <i>K. sonoriense</i>             |                         | (LeConte, 1854)  |
| <i>K. vogti</i>                  | E                       | (López-Luna, Cupul-Magaña, Escobedo-Galván, González-Hernández, Centenero-Alcalá, Rangel-Mendoza, Ramírez-Ramírez & Cazares-Hernández, 2018) |
| <b>GÉNERO</b> <i>Staurotypus</i> | <b>2/0</b>              |  |
| <i>S. salvinii</i>               |                         | (Gray, 1864)   |
| <i>S. triporcatus</i>            |                         | (Wiegmann, 1828)   |
| <b>FAMILIA TESTUDINIDAE (1)</b>  | <b>5/2</b>              |  |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)                           | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)  |
|--|-------------------------|---|
| <b>GÉNERO</b> <i>Gopherus</i>                      | <b>5/2</b>              |   |
| <i>G. agassizii</i>                                |                         | (Cooper, 1863)  |
| <i>G. berlandieri</i>                              |                         | (Agassiz, 1857)   |
| <i>G. evgoodei</i>                                 | <b>E</b>                | (Edwards, Karl, Vaughn, Rosen, Meléndez-Torres & Murphy 2016)             |
| <i>G. flavomarginatus</i>                          | <b>E</b>                | (Legler, 1959)  |
| <i>G. morafkai</i>                                 |                         | (Murphy, Berry, Edwards, Leviton, Lathrop & Riedle, 2011)                 |
| <b>FAMILIA TRIONYCHIDAE (1)</b>                    | <b>1/0</b>              |   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Apalone</i>                       | <b>1/0</b>              |   |
| <i>A. spinifera</i>                                |                         | (Le Sueur, 1827)  |
| <b>CROCODYLIA - Cocodrilos y caimanes (2/2)</b>    | <b>3/0</b>              |   |
| <b>FAMILIA ALLIGATORIDAE (1)</b>                   | <b>1/0</b>              |   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Caiman</i>                        | <b>1/0</b>              |   |
| <i>C. crocodilus</i>                               |                         | (Linnaeus, 1758)  |
| <b>FAMILIA CROCODYLIIDAE (1)</b>                   | <b>2/0</b>              |   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Crocodylus</i>                    | <b>2/0</b>              |   |
| <i>C. acutus</i>                                   |                         | (Cuvier, 1807)  |
| <i>C. moreletti</i>                                |                         | (Duméril & Bibron, 1851)  |
| <b>SQUAMATA - Lagartijas y serpientes (30/134)</b> | <b>913/559</b>          |   |
| <b>SAURIA - Lagartijas (19/47)</b>                 | <b>475/316</b>          |   |
| <b>FAMILIA ANGUIDAE (7)</b>                        | <b>51/40</b>            |   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Abronia</i>                       | <b>26/21</b>            |   |
| <i>A. antauges</i>                                 | <b>E</b>                | (Cope, 1866)  |
| <i>A. bogerti</i>                                  | <b>E</b>                | (Tihen, 1954)   |
| <i>A. chiszari</i>                                 | <b>E</b>                | (Smith & Smith, 1981)   |
| <i>A. cuetzpali</i>                                | <b>E</b>                | (Campbell, Solano-Zavaleta, Flores-Villela, Caviedes-Solis & Frost, 2016) |
| <i>A. deppei</i>                                   | <b>E</b>                | (Wiegmann, 1828)  |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)      | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                                 |
|-------------------------------|-------------------------|--|
| <i>A. fuscolabialis</i>       | E                       | (Tiben, 1944)                                    |
| <i>A. gadovii</i>             | E                       | (Boulenger, 1913)                                |
| <i>A. graminea</i>            | E                       | (Cope, 1864)                                     |
| <i>A. juarezi</i>             | E                       | (Karges & Wright, 1987)                          |
| <i>A. leurolepis</i>          | E                       | (Campbell & Frost, 1993)                         |
| <i>A. lythrochila</i>         |                         | (Smith & Álvarez del Toro, 1963)                 |
| <i>A. martindelcampoi</i>     | E                       | (Flores-Villela & Sánchez-Herrera, 2003)         |
| <i>A. matudai</i>             |                         | (Hartweg & Tihen, 1946)                          |
| <i>A. mitchelli</i>           | E                       | (Campbell, 1982)                                 |
| <i>A. mixteca</i>             | E                       | (Bogert & Porter, 1967)                          |
| <i>A. moreletii</i>           |                         | (Bocourt, 1871)                                  |
| <i>A. morenica</i>            | E                       | (Clause, Luna-Reyes & Nieto-Montes De Oca, 2020) |
| <i>A. oaxacae</i>             | E                       | (Günther, 1885)                                  |
| <i>A. ochoterenai</i>         |                         | (Martin del Campo, 1939)                         |
| <i>A. ornelasi</i>            | E                       | (Campbell, 1984)                                 |
| <i>A. rafaeli</i>             |                         | (Hartweg & Tihen, 1946)                          |
| <i>A. ramirezi</i>            | E                       | (Campbell, 1994)                                 |
| <i>A. reidi</i>               | E                       | (Werler & Shannon, 1961)                         |
| <i>A. smithi</i>              | E                       | (Campbell & Frost, 1993)                         |
| <i>A. taeniata</i>            | E                       | (Wiegmann, 1828)                                 |
| <i>A. temporalis</i>          | E                       | (Hartweg & Tihen, 1946)                          |
| <i>A. viridiflava</i>         | E                       | (Bocourt, 1873)                                  |
| <b>GÉNERO <i>Anniella</i></b> | <b>3/1</b>              |  |
| <i>A. geronimensis</i>        | E                       | (Shaw, 1940)                                     |
| <i>A. pulchra</i>             |                         | (Gray, 1852)                                     |
| <i>A. stebbinsi</i>           |                         | (Papenfuss & Parham, 2013)                       |
| <b>GÉNERO <i>Barisia</i></b>  | <b>7/7</b>              |  |
| <i>B. ciliaris</i>            | E                       | (Smith, 1942)                                    |
| <i>B. herrerae</i>            | E                       | (Zaldivar-Riverón & Nieto-Montes de Oca, 2003)   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)         | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)   |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| <i>B. imbricata</i>              | E                       | (Wiegmann, 1828)   |
| <i>B. jonesi</i>                 | E                       | (Guillette & Smith, 1982)  |
| <i>B. levicollis</i>             | E                       | (Stejneger, 1890)  |
| <i>B. platifrons</i>             | E                       | (Bocourt, 1878)  |
| <i>B. rudicollis</i>             | E                       | (Wiegmann, 1828)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Desertum</i>    | <b>2/2</b>              |  |
| <i>D. lazcanoi</i>               | E                       | (Banda-Leal, Nevárez-De los Reyes & Bryson, 2017)                                  |
| <i>D. lugoi</i>                  | E                       | (McCoy, 1970)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Elgaria</i>     | <b>5/3</b>              |  |
| <i>E. cedrosensis</i>            | E                       | (Fitch, 1934)  |
| <i>E. kingii</i>                 |                         | (Gray, 1838)   |
| <i>E. multicarinata</i>          |                         | (Blainville, 1835)   |
| <i>E. paucicarinata</i>          | E                       | (Fitch, 1934)  |
| <i>E. velazquezi</i>             | E                       | (Grismer & Hollingsworth, 2000)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Gerrhonotus</i> | <b>6/4</b>              |  |
| <i>G. farri</i>                  | E                       | (Bryson & Graham, 2010)  |
| <i>G. infenalis</i>              |                         | (Baird, 1859)  |
| <i>G. liocephalus</i>            |                         | (Wiegmann, 1828)   |
| <i>G. mccoyi</i>                 | E                       | (García-Vázquez, Contreras-Arquieta, Trujano-Ortega and Nieto-Montes de Oca, 2018) |
| <i>G. ophiurus</i>               | E                       | (Cope, 1866)   |
| <i>G. parvus</i>                 | E                       | (Knight & Scudder, 1985)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Ophisaurus</i>  | <b>2/2</b>              |  |
| <i>O. ceroni</i>                 | E                       | (Holman, 1965)   |
| <i>O. incomptus</i>              | E                       | (McConkey, 1955)   |
| <b>FAMILIA BIPEDIDAE (1)</b>     | <b>3/3</b>              |  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Bipes</i>       | <b>3/3</b>              |  |
| <i>B. biporus</i>                | E                       | (Cope, 1894)   |
| <i>B. canaliculatus</i>          | E                       | (Latreille, 1801)  |
| <i>B. tridactylus</i>            | E                       | (Dugès & Cope, 1894)   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)          | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                  |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>FAMILIA CORYTOPHANIDAE (3)</b> | <b>6/0</b>              |                                   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Basiliscus</i>   | <b>1/0</b>              |                                   |
| <i>B. vittatus</i>                |                         | (Wiegmann, 1828)                  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Corytophanes</i> | <b>3/0</b>              |                                   |
| <i>C. cristatus</i>               |                         | (Merrem, 1821)                    |
| <i>C. hernandesii</i>             |                         | (Wiegmann, Gray & Griffith, 1831) |
| <i>C. percarinatus</i>            |                         | (Durméril, 1856)                  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Laemancus</i>    | <b>2/0</b>              |                                   |
| <i>L. longipes</i>                |                         | (Wiegmann, 1834)                  |
| <i>L. serratus</i>                |                         | (Cope, 1864)                      |
| <b>FAMILIA CROTAPHYTIDAE (2)</b>  | <b>10/4</b>             |                                   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Crotaphytus</i>  | <b>8/4</b>              |                                   |
| <i>C. antiquus</i>                | <b>E</b>                | (Axtell & Webb, 1995)             |
| <i>C. collaris</i>                |                         | (Say, 1823)                       |
| <i>C. dickersonae</i>             | <b>E</b>                | (Schmidt, 1922)                   |
| <i>C. grismeri</i>                | <b>E</b>                | (McGuire, 1994)                   |
| <i>C. insularis</i>               | <b>E</b>                | (Van Denburgh & Slevin, 1921)     |
| <i>C. nebrius</i>                 |                         | (Axtell & Montanucci, 1977)       |
| <i>C. reticulatus</i>             |                         | (Baird, 1858)                     |
| <i>C. vestigium</i>               |                         | (Smith & Tanner, 1972)            |
| <b>GÉNERO</b> <i>Gambelia</i>     | <b>2/0</b>              |                                   |
| <i>G. copeii</i>                  |                         | (Yarrow, 1882)                    |
| <i>G. wislizenii</i>              |                         | (Baird & Girard, 1852)            |
| <b>FAMILIA DACTYLOIDAE (1)</b>    | <b>54/37</b>            |                                   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Anolis</i>       | <b>54/37</b>            |                                   |
| <i>A. alvarezdeltoroi</i>         | <b>E</b>                | (Nieto-Montes de Oca, 1996)       |
| <i>A. anisolepis</i>              | <b>E</b>                | (Smith, Burley & Fritts, 1968)    |
| <i>A. barkeri</i>                 | <b>E</b>                | (Schmidt, 1939)                   |
| <i>A. beckeri</i>                 |                         | (Boulenger, 1881)                 |
| <i>A. biporcatus</i>              |                         | (Wiegmann, 1834)                  |
| <i>A. boulengerianus</i>          | <b>E</b>                | (Thominot, 1887)                  |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)  | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)  |
|---------------------------|-------------------------|---|
| <i>A. brianjulianoi</i>   | E                       | (Köhler, Petersen & Méndez De La Cruz, 2019)              |
| <i>A. capito</i>          |                         | (Peters, 1863)  |
| <i>A. carlliebi</i>       | E                       | (Köhler, Trejo Pérez, Petersen & Méndez De La Cruz, 2014) |
| <i>A. compressicauda</i>  | E                       | (Smith & Kerster, 1955)                                   |
| <i>A. crassulus</i>       |                         | (Cope, 1864)  |
| <i>A. cristifer</i>       |                         | (Smith, 1968)   |
| <i>A. cuprinus</i>        | E                       | (Smith, 1964)   |
| <i>A. cymbops</i>         | E                       | (Cope, 1864)  |
| <i>A. dollfusianus</i>    |                         | (Bocourt, 1873)   |
| <i>A. duellmani</i>       | E                       | (Fitch & Henderson, 1973)                                 |
| <i>A. dunnii</i>          | E                       | (Smith, 1936)   |
| <i>A. gadovii</i>         | E                       | (Boulenger, 1905)   |
| <i>A. hobartsmithi</i>    | E                       | (Nieto-Montes de Oca, 1995)                               |
| <i>A. immaculogularis</i> | E                       | (Köhler, Trejo Pérez, Petersen & Méndez De La Cruz, 2014) |
| <i>A. laeviventris</i>    |                         | (Wiegmann, 1834)  |
| <i>A. lemurinus</i>       |                         | (Cope, 1861)  |
| <i>A. liogaster</i>       | E                       | (Boulenger, 1905)   |
| <i>A. macrinii</i>        | E                       | (Smith, 1968)   |
| <i>A. matudai</i>         |                         | (Smith, 1956)   |
| <i>A. megapholidotus</i>  | E                       | (Smith, 1933)   |
| <i>A. microlepidotus</i>  | E                       | (Davis, 1954)   |
| <i>A. milleri</i>         | E                       | (Smith, 1950)   |
| <i>A. naufragus</i>       | E                       | (Campbell, Hillis & Lamar, 1989)                          |
| <i>A. nebuloides</i>      | E                       | (Bocourt, 1873)   |
| <i>A. nebulosus</i>       | E                       | (Wiegmann, 1834)  |
| <i>A. nietoi</i>          | E                       | (Köhler, Trejo Pérez, Petersen & Méndez De La Cruz, 2014) |
| <i>A. omiltemanus</i>     | E                       | (Davis, 1954)   |
| <i>A. parvicirculatus</i> | E                       | (Álvarez del Toro & Smith, 1956)                          |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)           | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)  |
|------------------------------------|-------------------------|---|
| <i>A. petersii</i>                 |                         | (Bocourt, 1873)   |
| <i>A. peucephilus</i>              | E                       | (Köhler, Trejo Pérez, Petersen & Méndez De La Cruz, 2014) |
| <i>A. purpuronectes</i>            | E                       | (Gray, Meza-Lázaro, Poe & Nieto-Montes De Oca, 2016)      |
| <i>A. pygmaeus</i>                 | E                       | (Álvarez del Toro & Smith, 1956)                          |
| <i>A. quercorum</i>                | E                       | (Fitch, 1978)   |
| <i>A. rodriquezii</i>              |                         | (Bocourt, 1873)   |
| <i>A. rubiginosus</i>              | E                       | (Bocourt, 1873)   |
| <i>A. sacamecatensis</i>           | E                       | (Köhler, Trejo Pérez, Petersen & Méndez De La Cruz, 2014) |
| <i>A. schiedii</i>                 | E                       | (Wiegmann, 1834)  |
| <i>A. sericeus</i>                 |                         | (Hallowell, 1856)   |
| <i>A. serranoi</i>                 |                         | (Köhler, 1999)  |
| <i>A. spilorhipis</i>              | E                       | (Álvarez Del Toro & Smith, 1956)                          |
| <i>A. stevepoei</i>                | E                       | (Köhler, Trejo Pérez, Petersen & Méndez De La Cruz, 2014) |
| <i>A. subocularis</i>              | E                       | (Davis, 1954)   |
| <i>A. taylori</i>                  | E                       | (Smith & Spieler, 1945)                                   |
| <i>A. tropidonotus</i>             |                         | (Peters, 1863)  |
| <i>A. uniformis</i>                |                         | (Cope, 1885)  |
| <i>A. unilobatus</i>               |                         | (Köhler & Vesely, 2010)                                   |
| <i>A. ustus</i>                    |                         | (Cope, 1864)  |
| <i>A. zapotecorum</i>              | E                       | (Köhler, Trejo Pérez, Petersen & Méndez De La Cruz, 2014) |
| <b>FAMILIA DIBAMIDAE (1)</b>       | <b>1/1</b>              |   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Anelytropsis</i>  | <b>1/1</b>              |   |
| <i>A. papillosum</i>               | E                       | (Cope, 1885)  |
| <b>FAMILIA DIPLOGLOSSIDAE</b>      | <b>4/3</b>              |   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Siderolamprus</i> | <b>4/3</b>              |   |
| <i>S. enneagrammus</i>             | E                       | (Cope, 1860)  |
| <i>S. ingridae</i>                 | E                       | (Werler & Campbell, 2004)                                 |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)            | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                 |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <i>S. legnotus</i>                  | E                       | (Campbell & Camarillo, 1994)     |
| <i>S. rozellae</i>                  |                         | (Smith, 1942)                    |
| <b>FAMILIA EUBLEPHARIDAE (1)</b>    | <b>7/2</b>              |                                  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Coleonyx</i>       | <b>7/2</b>              |                                  |
| <i>C. brevis</i>                    |                         | (Stejneger, 1893)                |
| <i>C. elegans</i>                   |                         | (Gray, 1845)                     |
| <i>C. fasciatus</i>                 | E                       | (Boulenger, 1885)                |
| <i>C. gypsicolus</i>                | E                       | (Grismer & Ottley, 1988)         |
| <i>C. reticulatus</i>               |                         | (Davis & Dixon, 1958)            |
| <i>C. switaki</i>                   |                         | (Murphy, 1974)                   |
| <i>C. variegatus</i>                |                         | (Baird, 1858)                    |
| <b>FAMILIA GYMNOPHTHALMIDAE</b>     | <b>1/0</b>              |                                  |
| <b>(1)</b>                          |                         |                                  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Gymnophthalmus</i> | <b>1/0</b>              |                                  |
| <i>G. speciosus</i>                 |                         | (Hallowell, 1861)                |
| <b>FAMILIA HELODERMATIDAE (1)</b>   | <b>4/2</b>              |                                  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Heloderma</i>      | <b>4/2</b>              |                                  |
| <i>H. alvarezi</i>                  |                         | (Bogert & Martin Del Campo 1956) |
| <i>H. exasperatum</i>               | E                       | (Bogert & Martin Del Campo 1956) |
| <i>H. horridum</i>                  | E                       | (Wiegmann, 1829)                 |
| <i>H. suspectum</i>                 |                         | (Cope, 1869)                     |
| <b>FAMILIA IGUANIDAE (5)</b>        | <b>20/14</b>            |                                  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Cachryx</i>        | <b>2/1</b>              |                                  |
| <i>C. alfredschmidti</i>            |                         | (Köhler, 1995)                   |
| <i>C. defensor</i>                  | E                       | (Cope, 1866)                     |
| <b>GÉNERO</b> <i>Ctenosaura</i>     | <b>10/8</b>             |                                  |
| <i>C. acanthura</i>                 |                         | (Shaw, 1802)                     |
| <i>C. brachylopha</i>               | E                       | (Bailey, 1928)                   |
| <i>C. clarki</i>                    | E                       | (Bailey, 1928)                   |
| <i>C. conspicuosa</i>               | E                       | (Dickerson, 1919)                |
| <i>C. hemilopha</i>                 | E                       | (Cope, 1863)                     |
| <i>C. macrolopha</i>                | E                       | (Smith, 1972)                    |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)         | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                   |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <i>C. nolascensis</i>            | E                       | (Smith, 1972)                      |
| <i>C. oaxacana</i>               | E                       | (Köhler, Hasbun, 2001)             |
| <i>C. pectinata</i>              | E                       | (Wiegmann, 1834)                   |
| <i>C. similis</i>                |                         | (Gray, 1831)                       |
| <b>GÉNERO <i>Dipsosaurus</i></b> | <b>2/1</b>              |                                    |
| <i>D. catalinensis</i>           | E                       | (Van Denburgh, 1922)               |
| <i>D. dorsalis</i>               |                         | (Baird & Girard, 1852)             |
| <b>GÉNERO <i>Iguana</i></b>      | <b>1/0</b>              |                                    |
| <i>I. iguana</i>                 |                         | (Linnaeus, 1758)                   |
| <b>GÉNERO <i>Sauromalus</i></b>  | <b>5/4</b>              |                                    |
| <i>S. ater</i>                   |                         | (Duméril, 1856)                    |
| <i>S. hispidus</i>               | E                       | (Stejneger, 1891)                  |
| <i>S. klauberi</i>               | E                       | (Shaw, 1941)                       |
| <i>S. slevini</i>                | E                       | (Van Denburgh, 1922)               |
| <i>S. varius</i>                 | E                       | (Dickerson, 1919)                  |
| <b>FAMILIA MABUYIDAE (1)</b>     | <b>3/2</b>              |                                    |
| <b>GÉNERO <i>Marisora</i></b>    | <b>3/2</b>              |                                    |
| <i>M. aquilonaria</i>            | E                       | (McCrane, Matthews & Hedges, 2020) |
| <i>M. lineola</i>                |                         | (McCrane, Matthews & Hedges, 2020) |
| <i>M. syntoma</i>                | E                       | (McCrane, Matthews & Hedges, 2020) |
| <b>FAMILIA PHRYNOSOMATIDAE</b>   | <b>147/95</b>           |                                    |
| <b>(9)</b>                       |                         |                                    |
| <b>GÉNERO <i>Callisaurus</i></b> | <b>1/0</b>              |                                    |
| <i>C. draconoides</i>            |                         | (Blainville, 1835)                 |
| <b>GÉNERO <i>Cophosaurus</i></b> | <b>1/0</b>              |                                    |
| <i>C. texanus</i>                |                         | (Troschel, 1852)                   |
| <b>GÉNERO <i>Holbrookia</i></b>  | <b>5/1</b>              |                                    |
| <i>H. approximans</i>            | E                       | (Baird, 1859)                      |
| <i>H. elegans</i>                |                         | (Bocourt, 1874)                    |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)         | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)  |
|----------------------------------|-------------------------|---|
| <i>H. lacerata</i>               |                         | (Cope, 1880)  |
| <i>H. maculata</i>               |                         | (Girard, 1851)  |
| <i>H. propinqua</i>              |                         | (Baird & Girard, 1852)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Petrosaurus</i> | <b>4/3</b>              |   |
| <i>P. mearnsi</i>                |                         | (Stejneger, 1894)   |
| <i>P. repens</i>                 | <b>E</b>                | (Van Denburgh, 1895)  |
| <i>P. slevini</i>                | <b>E</b>                | (Van Denburgh, 1922)  |
| <i>P. thalassirus</i>            | <b>E</b>                | (Cope, 1863)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Phrynosoma</i>  | <b>18/8</b>             |   |
| <i>P. asio</i>                   |                         | (Cope, 1864)  |
| <i>P. blainvillii</i>            |                         | (Gray, 1839)  |
| <i>P. braconnieri</i>            | <b>E</b>                | (Duméril & Bocourt, 1870)   |
| <i>P. cerroense</i>              | <b>E</b>                | (Stejneger, 1893)   |
| <i>P. cornutum</i>               |                         | (Harlan, 1825)  |
| <i>P. coronatum</i>              | <b>E</b>                | (Blainville, 1835)  |
| <i>P. ditmarsi</i>               | <b>E</b>                | (Stejneger, 1906)   |
| <i>P. goodei</i>                 |                         | (Stejneger, 1893)   |
| <i>P. hernandesi</i>             |                         | (Girard, 1858)  |
| <i>P. mcallii</i>                |                         | (Hallowell, 1852)   |
| <i>P. modestum</i>               |                         | (Girard, 1852)  |
| <i>P. orbiculare</i>             | <b>E</b>                | (Linnaeus, 1758)  |
| <i>P. ornatissimum</i>           |                         | (Girard 1858)   |
| <i>P. platyrhinos</i>            |                         | (Girard, 1852)  |
| <i>P. sherbrookei</i>            | <b>E</b>                | (Nieto-Montes De Oca, Arenas-<br>Moreno, Beltrán-Sánchez & Leaché,<br>2014) |
| <i>P. solare</i>                 |                         | (Gray, 1845)  |
| <i>P. taurus</i>                 | <b>E</b>                | (Duges, 1873)   |
| <i>P. wigginsi</i>               | <b>E</b>                | (Montanucci, 2004)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Sceloporus</i>  | <b>100/70</b>           |   |
| <i>S. acanthinus</i>             |                         | (Bocourt, 1873)   |
| <i>S. adleri</i>                 | <b>E</b>                | (Smith & Savitsky, 1974)  |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros) | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)  |
|--------------------------|-------------------------|---|
| <i>S. aeneus</i>         | E                       | (Wiegmann, 1828)  |
| <i>S. albiventris</i>    | E                       | (Smith, 1939)   |
| <i>S. anahuacus</i>      | E                       | (Lara-Góngora, 1983)                                    |
| <i>S. angustus</i>       | E                       | (Dickerson, 1919)                                       |
| <i>S. asper</i>          | E                       | (Boulenger, 1897)                                       |
| <i>S. aurantius</i>      | E                       | (Grummer & Bryson, 2014)                                |
| <i>S. aureolus</i>       | E                       | (Smith, 1942)   |
| <i>S. bicanthalis</i>    | E                       | (Smith, 1937)   |
| <i>S. binocularis</i>    | E                       | (Dunn, 1936)  |
| <i>S. bimaculosus</i>    |                         | (Phelan & Brattstrom, 1955)                             |
| <i>S. brownorum</i>      | E                       | (Smith, Watkins-Colwell, Lemos-Espinal & Chiszar, 1997) |
| <i>S. bulleri</i>        | E                       | (Boulenger, 1894)                                       |
| <i>S. caeruleus</i>      | E                       | (Smith, 1936)   |
| <i>S. carinatus</i>      |                         | (Smith, 1936)   |
| <i>S. cautus</i>         | E                       | (Smith, 1938)   |
| <i>S. chaneyi</i>        | E                       | (Liner & Dixon, 1992)                                   |
| <i>S. chrysostictus</i>  |                         | (Cope, 1866)  |
| <i>S. clarkii</i>        |                         | (Baird & Girard, 1852)                                  |
| <i>S. couchii</i>        | E                       | (Baird, 1859)   |
| <i>S. cowlesi</i>        |                         | (Lowe & Norris, 1956)                                   |
| <i>S. cozumelae</i>      | E                       | (Jones, 1927)   |
| <i>S. cryptus</i>        | E                       | (Smith & Lynch, 1967)                                   |
| <i>S. cupreus</i>        | E                       | (Bocourt, 1873)   |
| <i>S. cyanogenys</i>     |                         | (Cope, 1885)  |
| <i>S. cyanostictus</i>   | E                       | (Axtell & Axtell, 1971)                                 |
| <i>S. dixoni</i>         | E                       | (Bryson & Grummer, 2021)                                |
| <i>S. druckercolini</i>  | E                       | (Perez-Ramos & Saldaña De la Riva, 2008)                |
| <i>S. dugesii</i>        | E                       | (Bocourt, 1873)   |
| <i>S. edwardtaylori</i>  | E                       | (Smith, 1936)   |
| <i>S. exsul</i>          | E                       | (Dixon, Ketchersid & Lieb, 1972)                        |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros) | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                         |
|--------------------------|-------------------------|--|
| <i>S. formosus</i>       | E                       | (Wiegmann, 1834)                         |
| <i>S. gadoviae</i>       | E                       | (Boulenger, 1905)                        |
| <i>S. gadsdeni</i>       | E                       | (Castañeda-Gaytán & Díaz-Cárdenas, 2017) |
| <i>S. goldmani</i>       | E                       | (Smith, 1937)                            |
| <i>S. graciosus</i>      |                         | (Baird & Girard, 1852)                   |
| <i>S. grammicus</i>      |                         | (Wiegmann, 1828)                         |
| <i>S. grandaevus</i>     | E                       | (Dickerson, 1919)                        |
| <i>S. halli</i>          | E                       | (Dasmann & Smith, 1974)                  |
| <i>S. hesperus</i>       | E                       | (Bryson & Grummer, 2021)                 |
| <i>S. heterolepis</i>    | E                       | (Bouleoger, 1894)                        |
| <i>S. horridus</i>       | E                       | (Wiegmann, 1834)                         |
| <i>S. hunsakeri</i>      | E                       | (Hall & Smith, 1979)                     |
| <i>S. insignis</i>       | E                       | (Webb, 1967)                             |
| <i>S. internasalis</i>   |                         | (Smith & Bumzahem, 1955)                 |
| <i>S. jalapae</i>        | E                       | (Günther, 1890)                          |
| <i>S. jarrovii</i>       |                         | (Cope, 1875)                             |
| <i>S. lemosespinali</i>  | E                       | (Lara-Góngora, 2004)                     |
| <i>S. licki</i>          | E                       | (Van Denburgh, 1895)                     |
| <i>S. lineatulus</i>     | E                       | (Dickerson, 1919)                        |
| <i>S. lundelli</i>       |                         | (Smith, 1939)                            |
| <i>S. macdougalli</i>    | E                       | (Smirh & Bumzahem, 1953)                 |
| <i>S. maculosus</i>      | E                       | (Smith, 1934)                            |
| <i>S. magister</i>       |                         | (Hallowell, 1854)                        |
| <i>S. madrensis</i>      | E                       | (Olson, 1986)                            |
| <i>S. marmoratus</i>     |                         | (Hallowell, 1852)                        |
| <i>S. megalepidurus</i>  | E                       | (Smith, 1934)                            |
| <i>S. melanogaster</i>   | E                       | (Dunn, 1936)                             |
| <i>S. melanorhinus</i>   |                         | (Bocourt, 1876)                          |
| <i>S. merriami</i>       |                         | (Stejneger, 1904)                        |
| <i>S. mikeprestoni</i>   | E                       | (Dunn, 1936)                             |
| <i>S. minor</i>          | E                       | (Cope, 1885)                             |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros) | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)         |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <i>S. mucronatus</i>     | E                       | (Cope, 1885)             |
| <i>S. nelsoni</i>        | E                       | (Cochran, 1923)          |
| <i>S. occidentalis</i>   |                         | (Baird & Girard, 1852)   |
| <i>S. ochoterenae</i>    | E                       | (Smith, 1934)            |
| <i>S. olivaceus</i>      |                         | (Smith, 1934)            |
| <i>S. omiltemanus</i>    | E                       | (Günther, 1890)          |
| <i>S. orcutti</i>        |                         | (Stejneger, 1893)        |
| <i>S. ornatus</i>        | E                       | (Baird, 1859)            |
| <i>S. palaciosi</i>      | E                       | (Lara-Góngora, 1983)     |
| <i>S. parvus</i>         | E                       | (Smith, 1934)            |
| <i>S. poinsettii</i>     |                         | (Baird & Girard, 1852)   |
| <i>S. pyrocephalus</i>   | E                       | (Cope, 1864)             |
| <i>S. salvini</i>        | E                       | (Günther, 1890)          |
| <i>S. samcolemani</i>    | E                       | (Smith & Hall, 1974)     |
| <i>S. scalaris</i>       | E                       | (Wiegmann, 1828)         |
| <i>S. scitulus</i>       | E                       | (Smith, 1942)            |
| <i>S. serrifer</i>       |                         | (Cope, 1866)             |
| <i>S. shannonorum</i>    | E                       | (Langebartel, 1959)      |
| <i>S. siniferus</i>      |                         | (Cope, 1870)             |
| <i>S. slevini</i>        |                         | (Smith, 1937)            |
| <i>S. smaragdinus</i>    |                         | (Bocourt, 1873)          |
| <i>S. smithi</i>         | E                       | (Hartweg & Oliver, 1937) |
| <i>S. spinosus</i>       | E                       | (Wiegmann, 1828)         |
| <i>S. squamosus</i>      |                         | (Bocourt, 1874)          |
| <i>S. stejnegeri</i>     | E                       | (Smith, 1942)            |
| <i>S. subpictus</i>      | E                       | (Lynch & Smith, 1965)    |
| <i>S. sugillatus</i>     | E                       | (Smith, 1942)            |
| <i>S. taeniocnemis</i>   |                         | (Cope, 1885)             |
| <i>S. tanneri</i>        | E                       | (Smith & Larsen, 1975)   |
| <i>S. teapensis</i>      |                         | (Günther, 1890)          |
| <i>S. torquatus</i>      | E                       | (Wiegmann, 1828)         |
| <i>S. unicanthalis</i>   | E                       | (Smith, 1937)            |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)            | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                    |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| <i>S. utiformis</i>                 | E                       | (Cope, 1864)                        |
| <i>S. vandenburgianus</i>           |                         | (Cope, 1896)                        |
| <i>S. variabilis</i>                |                         | (Wiegmann, 1834)                    |
| <i>S. virgatus</i>                  |                         | (Smith, 1938)                       |
| <i>S. zosteromus</i>                | E                       | (Cope, 1863)                        |
| <b>GÉNERO <i>Uma</i></b>            | <b>3/2</b>              |                                     |
| <i>U. exsul</i>                     | E                       | (Schmidt & Bogert, 1947)            |
| <i>U. notata</i>                    |                         | (Baird, 1858)                       |
| <i>U. paraphygas</i>                | E                       | (Williams, Chrapliwy & Smith, 1959) |
| <b>GÉNERO <i>Urosaurus</i></b>      | <b>8/5</b>              |                                     |
| <i>U. auriculatus</i>               | E                       | (Cope, 1871)                        |
| <i>U. bicarinatus</i>               | E                       | (Dumeríl, 1856)                     |
| <i>U. clarionensis</i>              | E                       | (Townsend, 1890)                    |
| <i>U. gadovi</i>                    | E                       | (Schmidt, 1921)                     |
| <i>U. graciosus</i>                 |                         | (Hallowell, 1854)                   |
| <i>U. lahtelai</i>                  | E                       | (Rau & Loomis, 1977)                |
| <i>U. nigricaudus</i>               |                         | (Cope, 1864)                        |
| <i>U. ornatus</i>                   |                         | (Baird & Girard, 1852)              |
| <b>GÉNERO <i>Uta</i></b>            | <b>7/6</b>              |                                     |
| <i>U. encantadae</i>                | E                       | (Grismer, 1994)                     |
| <i>U. lowei</i>                     | E                       | (Grismer, 1994)                     |
| <i>U. nolascensis</i>               | E                       | (Van Denburgh & Slevin, 1921)       |
| <i>U. palmeri</i>                   | E                       | (Stejneger, 1890)                   |
| <i>U. squamata</i>                  | E                       | (Dickerson, 1919)                   |
| <i>U. stansburiana</i>              |                         | (Baird & Girard, 1852)              |
| <i>U. tumidarostra</i>              | E                       | (Grismer, 1994)                     |
| <b>FAMILIA PHYLLODACTYLIDAE</b>     | <b>29/26</b>            |                                     |
| <b>(2)</b>                          |                         |                                     |
| <b>GÉNERO <i>Phyllodactylus</i></b> | <b>28/26</b>            |                                     |
| <i>P. angelensis</i>                | E                       | (Dixon, 1966)                       |
| <i>P. apricus</i>                   | E                       | (Dixon, 1966)                       |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)           | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)   |
|------------------------------------|-------------------------|--|
| <i>P. benedettii</i>               | E                       | (Ramírez-Reyes & Flores-Villela, 2018)   |
| <i>P. bordai</i>                   | E                       | (Taylor, 1942)   |
| <i>P. bugastrolepis</i>            | E                       | (Dixon, 1966)  |
| <i>P. cleofasensis</i>             | E                       | (Ramírez-Reyes, Barraza-Soltero, Nolasco-Luna, Flores-Villela & Escobedo-Galván) |
| <i>P. coronatus</i>                | E                       | (Dixon, 1966)  |
| <i>P. davisii</i>                  | E                       | (Dixon, 1964)  |
| <i>P. delcampoi</i>                | E                       | (Mosauer, 1936)  |
| <i>P. duellmani</i>                | E                       | (Dixon, 1960)  |
| <i>P. homolepidurus</i>            | E                       | (Smith, 1935)  |
| <i>P. isabelae</i>                 | E                       | (Castro-Franco & Uribe-Pena, 1992)   |
| <i>P. kropotkini</i>               | E                       | (Ramírez-Reyes & Flores-Villela, 2018)   |
| <i>P. lanei</i>                    | E                       | (Smith, 1935)  |
| <i>P. lupitae</i>                  | E                       | (Castro-Franco & Uribe-Pena 1992)  |
| <i>P. magnus</i>                   | E                       | (Taylor, 1942)   |
| <i>P. muralis</i>                  | E                       | (Taylor, 1940)   |
| <i>P. nocticulus</i>               |                         | (Dixon, 1964)  |
| <i>P. papenfussi</i>               | E                       | (Murphy, Blair & De La Cruz, 2009)   |
| <i>P. partidus</i>                 | E                       | (Dixon, 1966)  |
| <i>P. paucituberculatus</i>        | E                       | (Dixon, 1960)  |
| <i>P. rupinus</i>                  | E                       | (Dixon, 1964)  |
| <i>P. santacruzensis</i>           | E                       | (Dixon, 1966)  |
| <i>P. saxalitis</i>                | E                       | (Dixon, 1966)  |
| <i>P. tuberculosus</i>             |                         | (Wiegmann, 1835)   |
| <i>P. unctus</i>                   | E                       | (Cope, 1864)   |
| <i>P. xanti</i>                    | E                       | (Cope, 1863)   |
| <b>GÉNERO <i>Thecadactylus</i></b> | <b>1/0</b>              |  |
| <i>T. rapicauda</i>                |                         | (Houttuyn, 1782)   |
| <b>FAMILIA SCINCIDAE (3)</b>       | <b>25/17</b>            |  |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)         | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)   |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>GÉNERO</b> <i>Mesoscincus</i> | <b>2/1</b>              |  |
| <i>M. altamirani</i>             | E                       | (Dugés, 1891)  |
| <i>M. schwartzei</i>             |                         | (Fischer, 1884)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Plestiodon</i>  | <b>23/16</b>            |  |
| <i>P. bilineatus</i>             | E                       | (Tanner, 1958)   |
| <i>P. brevirostris</i>           | E                       | (Günther, 1860)  |
| <i>P. callicephalus</i>          |                         | (Bocourt, 1879)  |
| <i>P. colimensis</i>             | E                       | (Taylor, 1935)   |
| <i>P. copei</i>                  | E                       | (Taylor, 1933)   |
| <i>P. dicei</i>                  | E                       | (Ruthven & Gaige, 1933)  |
| <i>P. dugesii</i>                | E                       | (Thominot, 1883)   |
| <i>P. gilberti</i>               |                         | (Van Denburgh, 1896)   |
| <i>P. indubitus</i>              | E                       | (Taylor, 1933)   |
| <i>P. lagunensis</i>             | E                       | (Van Denburgh, 1895)   |
| <i>P. longiartus</i>             | E                       | (García-Vázquez, Pavón-Vázquez, Feria-Ortiz & Nieto-Montes de Oca, 2021)   |
| <i>P. lotus</i>                  | E                       | (Pavón-Vázquez, Nieto-Montes de Oca, Mendoza-Hernández, Centenero- Alcalá, Santa Cruz-Padilla & Jiménez Arcos, 2017) |
| <i>P. lynxe</i>                  | E                       | (Wiegmann, 1834)   |
| <i>P. multilineatus</i>          | E                       | (Tanner, 1957)   |
| <i>P. multivirgatus</i>          |                         | (Hallowell, 1857)  |
| <i>P. nietoi</i>                 | E                       | (Feria-Ortiz & García-Vázquez, 2012)   |
| <i>P. obsoletus</i>              |                         | (Baird & Girard, 1852)   |
| <i>P. ochoterenae</i>            | E                       | (Taylor, 1933)   |
| <i>P. parviauriculatus</i>       | E                       | (Taylor, 1933)   |
| <i>P. parvulus</i>               | E                       | (Taylor, 1933)   |
| <i>P. skiltonianus</i>           |                         | (Baird & Girard, 1852)   |
| <i>P. sumichrasti</i>            |                         | (Cope, 1866)   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)             | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)  |
|--------------------------------------|-------------------------|---|
| <i>P. tetragrammus</i>               |                         | (Baird, 1858)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Scincella</i>       | <b>9/5</b>              |   |
| <i>S. assata</i>                     |                         | (Cope, 1864)  |
| <i>S. cherriei</i>                   |                         | (Cope, 1893)  |
| <i>S. caudaequinae</i>               | <b>E</b>                | (Smith, 1951)   |
| <i>S. forbesorum</i>                 | <b>E</b>                | (Taylor, 1937)  |
| <i>S. gemmingeri</i>                 | <b>E</b>                | (Cope, 1864)  |
| <i>S. incerta</i>                    |                         | (Stuart, 1940)  |
| <i>S. kikaapoa</i>                   | <b>E</b>                | (García-Vázquez, Canseco-Márquez & Nieto-Montes de Oca, 2010) |
| <i>S. lateralis</i>                  |                         | (Say, James, 1823)  |
| <i>S. silvicola</i>                  | <b>E</b>                | (Taylor, 1937)  |
| <b>FAMILIA</b>                       | <b>4/0</b>              |   |
| <b>SPHAERODACTYLIDAE (3)</b>         |                         |   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Aristelliger</i>    | <b>1/0</b>              |   |
| <i>A. georgeensis</i>                |                         | (Bocourt, 1873)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Gonatodes</i>       | <b>1/0</b>              |   |
| <i>G. albogularis</i>                |                         | (Duméril & Bibron, 1836)                                      |
| <b>GÉNERO</b> <i>Sphaerodactylus</i> | <b>2/0</b>              |   |
| <i>S. continentalis</i>              |                         | (Werner, 1896)  |
| <i>S. glaucus</i>                    |                         | (Cope, 1866)  |
| <b>FAMILIA TEIIDAE (2)</b>           | <b>54/28</b>            |   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Aspidoscelis</i>    | <b>44/23</b>            |   |
| <i>A. angusticeps</i>                |                         | (Cope, 1878)  |
| <i>A. burti</i>                      |                         | (Taylor, 1938)  |
| <i>A. calidipes</i>                  | <b>E</b>                | (Duellman, 1955)  |
| <i>A. canus</i>                      | <b>E</b>                | (Van Denburgh & Slevin, 1921)                                 |
| <i>A. carmenensis</i>                | <b>E</b>                | (Maslin & Secoy, 1986)  |
| <i>A. catalinensis</i>               | <b>E</b>                | (Van Denburgh & Slevin, 1921)                                 |
| <i>A. celeripes</i>                  | <b>E</b>                | (Dickerson, 1919)   |
| <i>A. ceralbensis</i>                | <b>E</b>                | ((Van Denburgh & Slevin, 1921))                               |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros) | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                 |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <i>A. communis</i>       | E                       | (Cope, 1878)                     |
| <i>A. costatus</i>       | E                       | (Cope, 1878)                     |
| <i>A. cozumela</i>       | E                       | (Gadow, 1906)                    |
| <i>A. danheimae</i>      | E                       | (Burt, 1929)                     |
| <i>A. deppii</i>         |                         | (Wiegmann, 1834)                 |
| <i>A. espiricensis</i>   | E                       | (Van Denburgh & Slevin, 1921)    |
| <i>A. exsanguis</i>      |                         | (Lowe, 1956)                     |
| <i>A. franciscensis</i>  | E                       | (Van Denburgh & Slevin, 1921)    |
| <i>A. gularis</i>        |                         | (Baird & Girard, 1852)           |
| <i>A. guttatus</i>       | E                       | (Wiegmann, 1834)                 |
| <i>A. hyperythrus</i>    |                         | (Cope, 1863)                     |
| <i>A. inornatus</i>      |                         | (Baird, 1859)                    |
| <i>A. labialis</i>       | E                       | (Stejneger, 1890)                |
| <i>A. laredoensis</i>    |                         | (McKinney, Kay & Anderson, 1973) |
| <i>A. lineattissimus</i> | E                       | (Cope, 1878)                     |
| <i>A. marmoratus</i>     |                         | (Baird & Girard, 1852)           |
| <i>A. martyris</i>       | E                       | (Stejneger, 1891)                |
| <i>A. maslini</i>        |                         | (Fritts, 1969)                   |
| <i>A. maximus</i>        | E                       | (Cope, 1864)                     |
| <i>A. mexicanus</i>      | E                       | (Peters, 1879)                   |
| <i>A. montaguae</i>      |                         | (Sackett, 1941)                  |
| <i>A. neomexicanus</i>   |                         | (Lowe & Zweifel, 1952)           |
| <i>A. opatae</i>         | E                       | (Wright, 1967)                   |
| <i>A. parvisocius</i>    | E                       | (Zweifel, 1960)                  |
| <i>A. pictus</i>         | E                       | (Van Denburgh & Slevin, 1921)    |
| <i>A. rodecki</i>        | E                       | (McCoy & Maslin, 1962)           |
| <i>A. sackii</i>         | E                       | (Wiegmann, 1834)                 |
| <i>A. scalaris</i>       |                         | (Cope, 1892)                     |
| <i>A. septemvittatus</i> |                         | (Cope, 1892)                     |
| <i>A. sexlineatus</i>    |                         | (Linnaeus, 1766)                 |
| <i>A. sonorae</i>        |                         | (Lowe, Wright, 1964)             |
| <i>A. stictogrammus</i>  |                         | (Burger, 1950)                   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)         | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)  |
|----------------------------------|-------------------------|---|
| <i>A. tesselatus</i>             |                         | (Say & James, 1823)   |
| <i>A. tigris</i>                 |                         | (Baird, Girard, 1852)   |
| <i>A. uniparens</i>              |                         | (Wright & Lowe, 1965)   |
| <i>A. xanthonotus</i>            |                         | (Duellman & Lowe, 1953)                                       |
| <b>GÉNERO <i>Holcosus</i></b>    | <b>10/5</b>             |   |
| <i>H. amphigrammus</i>           | E                       | (Smith & Laufe, 1945)   |
| <i>H. chaitzami</i>              |                         | (Stuart, 1942)  |
| <i>H. festivus</i>               |                         | (Lichtenstein & Martens, 1856)                                |
| <i>H. gaigeae</i>                | E                       | (Smith & Laufe, 1946)   |
| <i>H. hartwegi</i>               |                         | (Smith, 1940)   |
| <i>H. parvus</i>                 |                         | (Barbour & Noble, 1915)                                       |
| <i>H. sinister</i>               | E                       | (Smith & Laufe, 1946)   |
| <i>H. stuarti</i>                | E                       | (Smith, 1940)   |
| <i>H. thomasi</i>                |                         | (Smith & Laufe, 1946)   |
| <i>H. udulatus</i>               | E                       | (Wiegmann, 1834)  |
| <b>FAMILIA XANTUSIIDAE (2)</b>   | <b>29/24</b>            |   |
| <b>GÉNERO <i>Lepidophyma</i></b> | <b>20/18</b>            |   |
| <i>L. chicoasensis</i>           | E                       | (Álvarez & Valetin, 1988)                                     |
| <i>L. cuicatecum</i>             | E                       | (Canseco-Márquez, Gutiérrez-Mayén & Mendoza-Hernández, 2008)  |
| <i>L. dontomasi</i>              | E                       | (Smith, 1942)   |
| <i>L. flavimaculatum</i>         |                         | (Duméril, 1851)   |
| <i>L. gaigeae</i>                | E                       | (Mosauer, 1936)   |
| <i>L. inagoi</i>                 | E                       | (Palacios-Aguilar, Santos-Bibiano & Flores Villela, 2018)     |
| <i>L. lineri</i>                 | E                       | (Smith, 1973)   |
| <i>L. lipetzi</i>                | E                       | (Smith & Álvarez del Toro, 1977)                              |
| <i>L. lowei</i>                  | E                       | (Bezy & Camarillo, 1997)                                      |
| <i>L. lusca</i>                  | E                       | (Arenas-Moreno, Muñoz-Nolasco, Bautista-Del Moral, Rodríguez- |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)        | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)  |
|---------------------------------|-------------------------|---|
|                                 |                         | Miranda, Domínguez-Guerrero & Méndez-De la Cruz, 2021)    |
| <i>L. micropholis</i>           | E                       | (Walker, 1955)  |
| <i>L. ocellor</i>               | E                       | (Smith, 1942)   |
| <i>L. pajapanensis</i>          | E                       | (Werler, 1957)  |
| <i>L. radula</i>                | E                       | (Smith, 1942)   |
| <i>L. ramirezi</i>              | E                       | (Lara-Tufiño & Nieto-Montes de Oca, 2021)                 |
| <i>L. smithii</i>               |                         | (Bocourt, 1876)   |
| <i>L. sylvaticum</i>            | E                       | (Taylor, 1939)  |
| <i>L. tarascae</i>              | E                       | (Bezy, Webb & Álvarez, 1982)                              |
| <i>L. tuxtlae</i>               | E                       | (Werler & Shannon, 1957)                                  |
| <i>L. zongolicum</i>            | E                       | (García-Vázquez, Canseco-Márquez & Aguilar-López, 2010)   |
| <b>GÉNERO <i>Xantusia</i></b>   | <b>9/6</b>              |   |
| <i>X. bolsonae</i>              | E                       | (Webb, 1970)  |
| <i>X. extorris</i>              | E                       | (Webb, 1965)  |
| <i>X. gilberti</i>              | E                       | (Van Denburgh, 1895)                                      |
| <i>X. henshawi</i>              |                         | (Stejneger, 1893)   |
| <i>X. jaycolei</i>              | E                       | (Bezy, Bezy & Bolles, 2008)                               |
| <i>X. sanchezi</i>              | E                       | (Bezy & Flores-Villela, 1999)                             |
| <i>X. sherbrookei</i>           | E                       | (Bezy, Bezy & Bolles, 2008)                               |
| <i>X. vigilis</i>               |                         | (Baird, 1859)   |
| <i>X. wigginsi</i>              |                         | (Savage, 1952)  |
| <b>FAMILIA XENOSAURIDAE (1)</b> | <b>13/12</b>            |   |
| <b>GÉNERO <i>Xenosaurus</i></b> | <b>13/12</b>            |   |
| <i>X. agrenon</i>               | E                       | (King & Thompson, 1968)                                   |
| <i>X. arboreus</i>              | E                       | (Lynch & Smith, 1965)                                     |
| <i>X. fractus</i>               | E                       | (Nieto-Montes de Oca, Sánchez-Vega & Durán-Fuentes, 2018) |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)              | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)   |
|---------------------------------------|-------------------------|--|
| <i>X. grandis</i>                     | E                       | (Gray, 1856)   |
| <i>X. mendozai</i>                    | E                       | (Nieto-Montes de Oca, García-Vázquez, Zúñiga-Vega, Schmidt-Ballardo, 2013) |
| <i>X. newmanorum</i>                  | E                       | (Taylor, 1949)   |
| <i>X. penai</i>                       | E                       | (Pérez-Ramos, Saldaña de la Riva & Campbell, 2000)                         |
| <i>X. phalaroanthereon</i>            | E                       | (Nieto-Montes de Oca, Campbell & Flores Villela, 2001)                     |
| <i>X. platyceps</i>                   | E                       | (King & Thompson, 1968)  |
| <i>X. rackhami</i>                    |                         | (Stuart, 1941)   |
| <i>X. rectocollaris</i>               | E                       | (Smith & Iverson, 1993)  |
| <i>X. sanmartinensis</i>              | E                       | (Werler & Shannon, 1961)   |
| <i>X. tzacualtipantecus</i>           | E                       | (Woolrich-Piña & Smith, 2012)  |
| <b>SERPENTES - Serpientes (11/87)</b> | <b>438/243</b>          |  |
| <b>FAMILIA BOIDAE (1)</b>             | <b>2/1</b>              |  |
| <b>GÉNERO Boa</b>                     | <b>2/1</b>              |  |
| <i>B. imperator</i>                   |                         | (Daudin, 1803)   |
| <i>B. sigma</i>                       | E                       | (Smith, 1943)  |
| <b>FAMILIA CHARINIDAE (3)</b>         | <b>3/1</b>              |  |
| <b>GÉNERO Exiliboa</b>                | <b>1/1</b>              |  |
| <i>E. placata</i>                     | E                       | (Bogert, 1968)   |
| <b>GÉNERO Lichanura</b>               | <b>1/0</b>              |  |
| <i>L. trivirgata</i>                  |                         | (Cope, 1861)   |
| <b>GÉNERO Ungaliophis</b>             | <b>1/0</b>              |  |
| <i>U. continentalis</i>               |                         | (Müller, 1882)   |
| <b>FAMILIA COLUBRIDAE (33)</b>        | <b>148/67</b>           |  |
| <b>GÉNERO Arizona</b>                 | <b>2/1</b>              |  |
| <i>A. elegans</i>                     |                         | (Kennicott & Baird, 1859)  |
| <i>A. pacata</i>                      | E                       | (Klauber, 1946)  |
| <b>GÉNERO Bogertophis</b>             | <b>2/0</b>              |  |
| <i>B. rosaliae</i>                    |                         | (Mocquard, 1899)   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)           | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                  |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <i>B. subocularis</i>              |                         | (Brown, 1901)                     |
| <b>GÉNERO</b> <i>Coluber</i>       | <b>1/0</b>              |                                   |
| <i>C. constrictor</i>              |                         | (Linnaeus, 1758)                  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Conopsis</i>      | <b>6/6</b>              |                                   |
| <i>C. acuta</i>                    | <b>E</b>                | (Cope, 1886)                      |
| <i>C. amphisticha</i>              | <b>E</b>                | (Smith & Laufe, 1945)             |
| <i>C. biserialis</i>               | <b>E</b>                | (Taylor & Smith, 1942)            |
| <i>C. lineata</i>                  | <b>E</b>                | (Kennicott & Baird, 1859)         |
| <i>C. megalodon</i>                | <b>E</b>                | (Taylor & Smith, 1942)            |
| <i>C. nasus</i>                    | <b>E</b>                | (Günther, 1858)                   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Dendrophidion</i> | <b>1/0</b>              |                                   |
| <i>D. vinitor</i>                  |                         | (Smith, 1941)                     |
| <b>GÉNERO</b> <i>Drymarchon</i>    | <b>1/0</b>              |                                   |
| <i>D. melanurus</i>                |                         | (Dumeríl, Bibron & Dumeríl, 1854) |
| <b>GÉNERO</b> <i>Drymobius</i>     | <b>2/0</b>              |                                   |
| <i>D. chloroticus</i>              |                         | (Cope, 1886)                      |
| <i>D. margaritiferus</i>           |                         | (Schlegel, 1837)                  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Ficimia</i>       | <b>7/5</b>              |                                   |
| <i>F. hardyi</i>                   | <b>E</b>                | (Mendoza-Quijano & Smith, 1993)   |
| <i>F. olivacea</i>                 | <b>E</b>                | (Gray, 1849)                      |
| <i>F. publia</i>                   |                         | (Cope, 1866)                      |
| <i>F. ramirezi</i>                 | <b>E</b>                | (Smith & Langebartel, 1949)       |
| <i>F. ruspator</i>                 | <b>E</b>                | (Smith & Taylor, 1941)            |
| <i>F. streckeri</i>                |                         | (Taylor, 1931)                    |
| <i>F. variegata</i>                | <b>E</b>                | (Günther, 1858)                   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Geagras</i>       | <b>1/1</b>              |                                   |
| <i>G. redimitus</i>                | <b>E</b>                | (Cope, 1876)                      |
| <b>GÉNERO</b> <i>Gyalopion</i>     | <b>2/0</b>              |                                   |
| <i>G. canum</i>                    |                         | (Cope, 1860)                      |
| <i>G. quadrangulare</i>            |                         | (Günther, Salvin & Godman, 1893)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Lampropeltis</i>  | <b>15/6</b>             |                                   |
| <i>L. alterna</i>                  |                         | (Brown, 1901)                     |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)         | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                  |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <i>L. californiae</i>            |                         | (Bainville, 1835)                 |
| <i>L. catalinensis</i>           | E                       | (Van Denburgh & Slevin, 1921)     |
| <i>L. greeri</i>                 | E                       | (Webb, 1961)                      |
| <i>L. holbrooki</i>              |                         | (Stejneger, 1902)                 |
| <i>L. knoblochi</i>              |                         | (Taylor, 1840)                    |
| <i>L. leonis</i>                 | E                       | (Günther, 1893)                   |
| <i>L. mexicana</i>               | E                       | (Garman, 1884)                    |
| <i>L. multifasciata</i>          |                         | (Bocourt, 1886)                   |
| <i>L. polyzona</i>               |                         | (Cope, 1860)                      |
| <i>L. ruthveni</i>               | E                       | (Blanchard, 1920)                 |
| <i>L. splendida</i>              |                         | (Baird & Girard, 1853)            |
| <i>L. triangulum</i>             |                         | (Lacépède, 1789)                  |
| <i>L. webbi</i>                  | E                       | (Brison, Dixon & Lazcano, 2005)   |
| <i>L. zonata</i>                 |                         | (Lockington, 1835)                |
| <b>GÉNERO <i>Leptophis</i></b>   | <b>4/1</b>              |                                   |
| <i>L. ahaetulla</i>              |                         | (Linnaeus, 1758)                  |
| <i>L. diplostropis</i>           | E                       | (Günther, 1872)                   |
| <i>L. mexicanus</i>              |                         | (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) |
| <i>L. modestus</i>               |                         | (Günther, 1872)                   |
| <b>GÉNERO <i>Masticophis</i></b> | <b>13/5</b>             |                                   |
| <i>M. anthonyi</i>               | E                       | (Stejneger, 1901)                 |
| <i>M. aurigulus</i>              | E                       | (Cope, 1861)                      |
| <i>M. barbouri</i>               | E                       | (Van Denburgh & Slevin, 1921)     |
| <i>M. bilineatus</i>             |                         | (Jan, 1863)                       |
| <i>M. flagellum</i>              |                         | (Shaw, 1802)                      |
| <i>M. fuliginosus</i>            |                         | (Cope, 1895)                      |
| <i>M. lateralis</i>              |                         | (Hallowell, 1853)                 |
| <i>M. lineatus</i>               | E                       | (Werler & Shannon, 1961)          |
| <i>M. mentovarius</i>            |                         | (Dumeril, Bibron & Dumeril, 1854) |
| <i>M. piceus</i>                 | E                       | (Cope, 1892)                      |
| <i>M. schotti</i>                |                         | (Baird & Girard, 1853)            |
| <i>M. slevini</i>                | E                       | (Lowe & Norris, 1955)             |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)            | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)         |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <i>M. taeniatus</i>                 |                         | (Hallowell, 1852)        |
| <b>GÉNERO</b> <i>Mastigodryas</i>   | <b>2/1</b>              |                          |
| <i>M. cliftoni</i>                  | E                       | (Hardy, 1964)            |
| <i>M. melanolomus</i>               |                         | (Cope, 1868)             |
| <b>GÉNERO</b> <i>Opheodrys</i>      | <b>2/0</b>              |                          |
| <i>O. aestivus</i>                  |                         | (Linnaeus, 1766)         |
| <i>O. vernalis</i>                  |                         | (Harlan, 1827)           |
| <b>GÉNERO</b> <i>Oxybelis</i>       | <b>3/1</b>              |                          |
| <i>O. fulgidus</i>                  |                         | (Daudin, 1803)           |
| <i>O. microphthalmus</i>            |                         | (Barbour & Amaral, 1926) |
| <i>O. potosiensis</i>               | E                       | (Taylor, 1941)           |
| <b>GÉNERO</b> <i>Pantherophis</i>   | <b>2/0</b>              |                          |
| <i>P. bairdi</i>                    |                         | (Yarrow, 1880)           |
| <i>P. emoryi</i>                    |                         | (Baird & Girard, 1853)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Phrynonax</i>      | <b>1/0</b>              |                          |
| <i>P. poecilonotus</i>              |                         | (Günther, 1858)          |
| <b>GÉNERO</b> <i>Phyllorhynchus</i> | <b>2/0</b>              |                          |
| <i>P. browni</i>                    |                         | (Stejneger, 1890)        |
| <i>P. decurtatus</i>                |                         | (Cope, 1868)             |
| <b>GÉNERO</b> <i>Pituophis</i>      | <b>5/3</b>              |                          |
| <i>P. catenifer</i>                 |                         | (Blainville, 1835)       |
| <i>P. deppei</i>                    | E                       | (Duméril, 1853)          |
| <i>P. insulanus</i>                 | E                       | (Klauber, 1946)          |
| <i>P. lineaticollis</i>             |                         | (Cope, 1861)             |
| <i>P. vertebralis</i>               | E                       | (Blainville, 1835)       |
| <b>GÉNERO</b> <i>Pseudelaphe</i>    | <b>2/1</b>              |                          |
| <i>P. flavigularis</i>              |                         | (Cope, 1867)             |
| <i>P. phaescens</i>                 | E                       | (Dowling, 1952)          |
| <b>GÉNERO</b> <i>Pseudoficimia</i>  | <b>1/1</b>              |                          |
| <i>P. frontalis</i>                 | E                       | (Cope, 1864)             |
| <b>GÉNERO</b> <i>Rhinocheilus</i>   | <b>3/2</b>              |                          |
| <i>R. antonii</i>                   | E                       |                          |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)        | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                                    |
|---------------------------------|-------------------------|---|
| <i>R. etheridgei</i>            | E                       | (Grismer, 1990)                                     |
| <i>R. lecontei</i>              |                         | (Baird & Girard, 1853)                              |
| <b>GÉNERO</b> <i>Salvadora</i>  | <b>9/5</b>              |   |
| <i>S. bairdi</i>                | E                       | (Jan, 1860)   |
| <i>S. deserticola</i>           |                         | (Schmidt, 1940)                                     |
| <i>S. grahamiae</i>             |                         | (Baird & Girard, 1853)                              |
| <i>S. gymnorhachis</i>          | E                       | (Hernández-Jiménez, Flores-Villela & Cambell, 2019) |
| <i>S. hexalepis</i>             |                         | (Cope, 1866)  |
| <i>S. intermedia</i>            | E                       | (Hartweg, 1940)                                     |
| <i>S. lemniscata</i>            | E                       | (Cope, 1895)  |
| <i>S. lineata</i>               |                         | (Schmidt, 1940)                                     |
| <i>S. mexicana</i>              | E                       | (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)                   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Senticolis</i> | <b>1/0</b>              |   |
| <i>S. triaspis</i>              |                         | (Cope, 1866)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Sonora</i>     | <b>12/7</b>             |   |
| <i>S. aemula</i>                | E                       | (Cope, 1879)  |
| <i>S. annulata</i>              |                         | (Baird, 1859)                                       |
| <i>S. cincta</i>                |                         | (Cope, 1861)  |
| <i>S. episcopa</i>              |                         | (Kennicott, 1859)                                   |
| <i>S. fasciata</i>              | E                       | (Cope, 1892)  |
| <i>S. michoacanensis</i>        | E                       | (Dugès, 1884)                                       |
| <i>S. mosaueri</i>              | E                       | (Stickel, 1938)                                     |
| <i>S. mutabilis</i>             | E                       | (Stickel, 1943)                                     |
| <i>S. palarostris</i>           |                         | (Klauber, 1937)                                     |
| <i>S. savagei</i>               | E                       | (Cliff, 1954)                                       |
| <i>S. semiannulata</i>          |                         | (Baird & Girard, 1853)                              |
| <i>S. straminea</i>             | E                       | (Cope, 1860)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Spilotes</i>   | <b>1/0</b>              |   |
| <i>S. pullatus</i>              |                         | (Linnaeus, 1758)                                    |
| <b>GÉNERO</b> <i>Stenorhina</i> | <b>2/0</b>              |   |
| <i>S. degenhardtii</i>          |                         | (Berthold, 1846)                                    |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)        | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)  |
|---------------------------------|-------------------------|---|
| <i>S. freminvillii</i>          |                         | (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)                                       |
| <b>GÉNERO</b> <i>Sympimus</i>   | <b>2/1</b>              |   |
| <i>S. leucostomus</i>           | E                       | (Cope, 1869)  |
| <i>S. mayae</i>                 |                         | (Gaige, 1936)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Syphololis</i> | <b>1/1</b>              |   |
| <i>S. lippiens</i>              | E                       | (Cope, 1861)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Tantilla</i>   | <b>31/17</b>            |   |
| <i>T. atriceps</i>              |                         | (Günther, Salvin & Godman, 1895)  |
| <i>T. bocourti</i>              | E                       | (Günther, Salvin & Godman, 1895)  |
| <i>T. briggsi</i>               | E                       | (Savitzky & Smith, 1971)  |
| <i>T. calamarina</i>            | E                       | (Cope, 1866)  |
| <i>T. cascadae</i>              | E                       | (Wilson & Meyer, 1981)  |
| <i>T. ceboruca</i>              | E                       | (Canseco-Márquez, Smith, Ponce-Campos, Flores-Villela & Campbell, 2007) |
| <i>T. coronadoi</i>             | E                       | (Hartweg, 1944)   |
| <i>T. cucullata</i>             |                         | (Minton, 1956)  |
| <i>T. cuniculator</i>           |                         | (Smith, 1939)   |
| <i>T. deppei</i>                | E                       | (Bocourt, 1883)   |
| <i>T. flavilineata</i>          | E                       | (Smith & Burger, 1950)  |
| <i>T. gracilis</i>              |                         | (Baird & Girard, 1853)  |
| <i>T. hobartsmithi</i>          |                         | (Taylor, 1936)  |
| <i>T. impensa</i>               |                         | (Campbell, 1998)  |
| <i>T. johnsoni</i>              | E                       | (Wilson, Vaughan & Dixon, 1999)   |
| <i>T. moesta</i>                |                         | (Günther, 1863)   |
| <i>T. nigriceps</i>             |                         | (Kennicott, 1860)   |
| <i>T. oaxacae</i>               | E                       | (Wilson & Meyer, 1971)  |
| <i>T. planiceps</i>             |                         | (Blainville, 1835)  |
| <i>T. robusta</i>               | E                       | (Canseco-Márquez, Mendelson & Gutiérrez-Mayén, 2002)                    |
| <i>T. rubra</i>                 |                         | (Cope, 1875)  |
| <i>T. schistosa</i>             |                         | (Bocourt, 1883)   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)          | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                      |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <i>T. sertula</i>                 | E                       | (Wilson & Campbell, 2000)             |
| <i>T. shawi</i>                   | E                       | (Taylor, 1949)                        |
| <i>T. slavensi</i>                | E                       | (Pérez-Higareda, Smith & Smith, 1985) |
| <i>T. striata</i>                 | E                       | (Dunn, 1928)                          |
| <i>T. tayrae</i>                  | E                       | (Wilson, 1983)                        |
| <i>T. triseriata</i>              | E                       | (Smith & Smith, 1951)                 |
| <i>T. vulcani</i>                 |                         | (Campbell, 1998)                      |
| <i>T. wilcoxi</i>                 |                         | (Stejneger, 1902)                     |
| <i>T. yaquia</i>                  |                         | (Smith, 1942)                         |
| <b>GÉNERO <i>Tantillita</i></b>   | <b>3/0</b>              |                                       |
| <i>T. brevissima</i>              |                         | (Taylor, 1937)                        |
| <i>T. canula</i>                  |                         | (Cope, 1876)                          |
| <i>T. lintoni</i>                 |                         | (Smith, 1940)                         |
| <b>GÉNERO <i>Trimorphodon</i></b> | <b>6/2</b>              |                                       |
| <i>T. biscutatus</i>              |                         | (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)     |
| <i>T. lambda</i>                  |                         | (Cope, 1886)                          |
| <i>T. lyrophanes</i>              |                         | (Cope, 1860)                          |
| <i>T. paucimaculatus</i>          | E                       | (Taylor, 1938)                        |
| <i>T. tau</i>                     | E                       | (Cope, 1870)                          |
| <i>T. vilkinsonii</i>             |                         | (Cope, 1886)                          |
| <b>FAMILIA DIPSADIDAE (29)</b>    | <b>152/90</b>           |                                       |
| <b>GÉNERO <i>Adelphicos</i></b>   | <b>6/3</b>              |                                       |
| <i>A. latifasciatum</i>           | E                       | (Lynch & Smith, 1966)                 |
| <i>A. newmanorum</i>              | E                       | (Taylor, 1950)                        |
| <i>A. nigrilatum</i>              | E                       | (Smith, 1942)                         |
| <i>A. quadrivirgatum</i>          |                         | (Jan, 1862)                           |
| <i>A. sargii</i>                  |                         | (Fischer, 1885)                       |
| <i>A. visoninum</i>               |                         | (Cope, 1866)                          |
| <b>GÉNERO <i>Amastridium</i></b>  | <b>1/0</b>              |                                       |
| <i>A. sapperi</i>                 |                         | (Werner, 1903)                        |
| <b>GÉNERO <i>Cenaspis</i></b>     | <b>1/1</b>              |                                       |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)          | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                                     |
|-----------------------------------|-------------------------|--|
| <i>C. aenigma</i>                 | E                       | (Campbell, Smith & Hall, 2018)                       |
| <b>GÉNERO</b> <i>Chersodromus</i> | <b>4/4</b>              |  |
| <i>C. australis</i>               | E                       | (Canseco-Márquez, Ramírez-González & Campbell, 2018) |
| <i>C. liebmanni</i>               | E                       | (Reinhardt, 1861)                                    |
| <i>C. nigrum</i>                  | E                       | (Canseco-Márquez, Ramírez-González & Campbell, 2018) |
| <i>C. rubriventris</i>            | E                       | (Taylor, 1949)                                       |
| <b>GÉNERO</b> <i>Clelia</i>       | <b>1/0</b>              |  |
| <i>C. scytalina</i>               |                         | (Cope, 1867)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Coniophanes</i>  | <b>13/7</b>             |  |
| <i>C. alvarezi</i>                | E                       | (Campbell, 1989)                                     |
| <i>C. bipunctatus</i>             |                         | (Günther, 1858)                                      |
| <i>C. fissidens</i>               |                         | (Günther, 1858)                                      |
| <i>C. imperialis</i>              |                         | (Baird & Girard, 1859)                               |
| <i>C. lateritus</i>               | E                       | (Cope, 1862)   |
| <i>C. melanocephalus</i>          | E                       | (Peters, 1869)                                       |
| <i>C. meridianus</i>              | E                       | (Schmidt & Andrews, 1936)                            |
| <i>C. michoacanensis</i>          | E                       | (Flores- Villela & Smith, 2009)                      |
| <i>C. piceivittis</i>             |                         | (Cope, 1869)   |
| <i>C. quinquevittatus</i>         |                         | (Dumeril, Bibron & Dumeril, 1854)                    |
| <i>C. schmidti</i>                |                         | (Bailey, 1937)                                       |
| <i>C. taeniatus</i>               | E                       | (Peters, 1869)                                       |
| <i>C. taylori</i>                 | E                       | (Hall, 1951)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Conophis</i>     | <b>3/1</b>              |  |
| <i>C. lineatus</i>                |                         | (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)                    |
| <i>C. morai</i>                   | E                       | (Pérez-Higareda & Smith, 2002)                       |
| <i>C. vittatus</i>                |                         | (Peters, 1860)                                       |
| <b>GÉNERO</b> <i>Cryophis</i>     | <b>1/1</b>              |  |
| <i>C. hallbergi</i>               | E                       | (Bogert & Duellman, 1963)                            |
| <b>GÉNERO</b> <i>Diadophis</i>    | <b>1/0</b>              |  |
| <i>D. punctatus</i>               |                         | (Linnaeus, 1766)                                     |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)     | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)   |
|------------------------------|-------------------------|--|
| <b>GÉNERO</b> <i>Dipsas</i>  | <b>3/2</b>              |  |
| <i>D. brevifacies</i>        |                         | (Cope, 1866)   |
| <i>D. gaigeae</i>            | <b>E</b>                | (Oliver, 1937)   |
| <i>D. maxillaries</i>        | <b>E</b>                | (Werner, 1910)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Enulius</i> | <b>2/1</b>              |  |
| <i>E. flavigularis</i>       |                         | (Cope, 1869)   |
| <i>E. oligostichus</i>       | <b>E</b>                | (Smith, Arndt & Sherbrook, 1967)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Geophis</i> | <b>39/32</b>            |  |
| <i>T. annulifera</i>         | <b>E</b>                | (Boulenger, 1894)  |
| <i>G. anocularis</i>         | <b>E</b>                | (Dunn, 1920)   |
| <i>G. bicolor</i>            | <b>E</b>                | (Günther, 1868)  |
| <i>G. blanchardi</i>         | <b>E</b>                | (Taylor & Smith, 1939)   |
| <i>G. cansecoi</i>           | <b>E</b>                | (Grünwald, Ahumada-Carrillo, Grünwald, Montaño-Ruvalcaba & García-Vázquez, 2021) |
| <i>G. cancellatus</i>        |                         | (Smith, 1941)  |
| <i>G. carinosus</i>          |                         | (Stuart, 1941)   |
| <i>G. chalybeus</i>          | <b>E</b>                | (Wagler, 1830)   |
| <i>G. dubius</i>             | <b>E</b>                | (Peters, 1861)   |
| <i>G. duellmani</i>          | <b>E</b>                | (Smith & Holland, 1969)  |
| <i>G. dugesii</i>            | <b>E</b>                | (Bocourt, 1883)  |
| <i>G. fuscus</i>             | <b>E</b>                | (Fischer, 1886)  |
| <i>G. immaculatus</i>        |                         | (Downs, 1967)  |
| <i>G. incomptus</i>          | <b>E</b>                | (Duellman, 1959)   |
| <i>G. isthmicus</i>          | <b>E</b>                | (Boulenger, 1894)  |
| <i>G. juarezi</i>            | <b>E</b>                | (Nieto-Montes de Oca, 2003)  |
| <i>G. juliae</i>             | <b>E</b>                | (Pérez-Higareda, Smith & López-Luna, 2001)                                       |
| <i>G. laticinctus</i>        | <b>E</b>                | (Smith & Williams, 1963)   |
| <i>G. laticollaris</i>       | <b>E</b>                | (Smith, Lynch & Altig, 1965)   |
| <i>G. latifrontalis</i>      | <b>E</b>                | (Garman, 1883)   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)        | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)   |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| <i>G. lorancai</i>              | E                       | (Canseco-Márquez, Pavón-Vázquez, López-Luna & Nieto-Montes De Oca, 2016)       |
| <i>G. maculiferus</i>           | E                       | (Taylor, 1941)   |
| <i>G. mutitorques</i>           | E                       | (Cope, 1885)   |
| <i>G. nasalis</i>               |                         | (Cope, 1868)   |
| <i>G. nigrocinctus</i>          | E                       | (Duellman, 1959)   |
| <i>G. occabus</i>               | E                       | (Pavón-Vázquez, García-Vázquez, Blancas-Hernández & Nieto-Montes de Oca, 2011) |
| <i>G. omiltemanus</i>           | E                       | (Günther, Salvin & Godman, 1893)   |
| <i>G. petersii</i>              | E                       | (Boulenger, 1894)  |
| <i>G. pyburni</i>               | E                       | (Campbell & Murphy, 1977)  |
| <i>G. rhodogaster</i>           |                         | (Cope, 1868)   |
| <i>G. rostralis</i>             | E                       | (Jan, 1865)  |
| <i>G. russatus</i>              | E                       | (Smith & Williams, 1966)   |
| <i>G. sallaei</i>               | E                       | (Boulenger, 1894)  |
| <i>G. sartorii</i>              |                         | (Cope, 1863)   |
| <i>G. semidoliatus</i>          | E                       | (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)  |
| <i>G. sieboldi</i>              | E                       | (Jan, 1862)  |
| <i>G. sanniolus</i>             |                         | (Cope, 1866)   |
| <i>G. tarascae</i>              | E                       | (Hartweg, 1959)  |
| <i>G. turbidus</i>              | E                       | (Pavón-Vázquez, Canseco-Márquez & Nieto-Montes de Oca, 2013)                   |
| <b>GÉNERO <i>Heterodon</i></b>  | <b>1/0</b>              |  |
| <i>H. kennerlyi</i>             |                         | (Kennicott, 1860)  |
| <b>GÉNERO <i>Hypsiglena</i></b> | <b>9/6</b>              |  |
| <i>H. affinis</i>               | E                       | (Boulenger, 1894)  |
| <i>H. catalinae</i>             | E                       | (Tanner, 1966)   |
| <i>H. chlorophaea</i>           |                         | (Cope, 1860)   |
| <i>H. jani</i>                  |                         | (Dugès, 1865)  |
| <i>H. ochrorhyncha</i>          |                         | (Cope, 1860)   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)              | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                  |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <i>H. slevini</i>                     | E                       | (Tanner, 1943)                    |
| <i>H. tanzeri</i>                     | E                       | (Dixon & Lieb, 1972)              |
| <i>H. torquata</i>                    | E                       | (Günther, 1860)                   |
| <i>H. unaocularus</i>                 | E                       | (Tanner, 1946)                    |
| <b>GÉNERO <i>Imantodes</i></b>        | <b>3/0</b>              |                                   |
| <i>I. cenchoa</i>                     |                         | (Linnaeus, 1758)                  |
| <i>I. gemmistratus</i>                |                         | (Cope, 1861)                      |
| <i>I. tenuissimus</i>                 |                         | (Cope, 1867)                      |
| <b>GÉNERO <i>Leptodeira</i></b>       | <b>8/3</b>              |                                   |
| <i>L. frenata</i>                     |                         | (Cope, 1886)                      |
| <i>L. maculata</i>                    |                         | (Hallowell, 1861)                 |
| <i>L. nigrofasciata</i>               |                         | (Günther, 1868)                   |
| <i>L. polysticta</i>                  |                         | (Günther, 1895)                   |
| <i>L. punctata</i>                    | E                       | (Peters, 1866)                    |
| <i>L. septentrionalis</i>             |                         | (Kennicott, 1859)                 |
| <i>L. splendida</i>                   | E                       | (Günther, 1895)                   |
| <i>L. uribei</i>                      | E                       | (Ramírez-Bautista & Smith, 1992)  |
| <b>GÉNERO <i>Manolepis</i></b>        | <b>1/1</b>              |                                   |
| <i>M. putnami</i>                     | E                       | (Jan, 1863)                       |
| <b>GÉNERO <i>Ninia</i></b>            | <b>2/0</b>              |                                   |
| <i>N. diademata</i>                   |                         | (Baird, Girard, 1853)             |
| <i>N. sebae</i>                       |                         | (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) |
| <b>GÉNERO <i>Oxyrhopus</i></b>        | <b>1/0</b>              |                                   |
| <i>O. petolarius</i>                  |                         | (Linnaeus, 1758)                  |
| <b>GÉNERO <i>Pliocercus</i></b>       | <b>1/0</b>              |                                   |
| <i>P. elapoides</i>                   |                         | (Cope, 1860)                      |
| <b>GÉNERO <i>Pseudoleptodeira</i></b> | <b>1/0</b>              |                                   |
| <i>P. latifasciata</i>                |                         | (Günther, 1894)                   |
| <b>GÉNERO <i>Rhadinaea</i></b>        | <b>16/15</b>            |                                   |
| <i>R. bogertorum</i>                  | E                       | (Myers, 1974)                     |
| <i>R. cuneata</i>                     | E                       | (Myers, 1974)                     |
| <i>R. decorata</i>                    |                         | (Günther, 1858)                   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)          | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)   |
|-----------------------------------|-------------------------|--|
| <i>R. forbesi</i>                 | E                       | (Smith, 1942)  |
| <i>R. fulvivittis</i>             | E                       | (Cope, 1875)   |
| <i>R. gaigeae</i>                 | E                       | (Bailey, 1937)   |
| <i>R. hesperia</i>                | E                       | (Bailey, 1940)   |
| <i>R. laureata</i>                | E                       | (Günther, 1868)  |
| <i>R. macdougallii</i>            | E                       | (Smith & Langebartel, 1949)  |
| <i>R. marcellae</i>               | E                       | (Taylor, 1949)   |
| <i>R. montana</i>                 | E                       | (Smith, 1944)  |
| <i>R. myersi</i>                  | E                       | (Rossman, 1965)  |
| <i>R. nuchalis</i>                | E                       | (García-Vázquez, Pavón-Vázquez, Blancas-Hernández, Blancas-Calva & Centenero-Alcalá, 2018) |
| <i>R. omiltemana</i>              | E                       | (Günther, 1894)  |
| <i>R. quinquelineata</i>          | E                       | (Cope, 1886)   |
| <i>R. taeniata</i>                | E                       | (Peters, 1863)   |
| <b>GÉNERO <i>Rhadinella</i></b>   | <b>9/4</b>              |  |
| <i>R. donaji</i>                  | E                       | (Campbell, 2015)   |
| <i>R. dysmica</i>                 | E                       | (Campillo, Dávila-Galavíz, Flores-Villela & Campbell, 2016)                                |
| <i>R. godmani</i>                 |                         | (Günther, 1865)  |
| <i>R. hannsteini</i>              |                         | (Stuart, 1949)   |
| <i>R. kanalchutchan</i>           | E                       | (Mendelson & Kizirian, 1995)   |
| <i>R. kinkelini</i>               |                         | (Boettger, 1898)   |
| <i>R. lachrymans</i>              |                         | (Cope, 1870)   |
| <i>R. posadasi</i>                |                         | (Slevin, 1936)   |
| <i>R. schistosa</i>               | E                       | (Smith, 1941)  |
| <b>GÉNERO <i>Rhadiophanes</i></b> | <b>1/1</b>              |  |
| <i>R. monticola</i>               | E                       | (Myers & Campbell, 1981)   |
| <b>GÉNERO <i>Sibon</i></b>        | <b>3/1</b>              |  |
| <i>S. dimidiatus</i>              |                         | (Günther, 1872)  |
| <i>S. linearis</i>                | E                       | (Pérez-Higareda, López-Luna & Smith, 2002)   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)           | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)  |
|------------------------------------|-------------------------|---|
| <i>S. nebulatus</i>                |                         | (Linnaeus, 1758)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Tantalophis</i>   | <b>1/1</b>              |   |
| <i>T. discolor</i>                 | <b>E</b>                | (Günther, 1860)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Tretanorhinus</i> | <b>1/0</b>              |   |
| <i>T. nigroluteus</i>              |                         | (Cope, 1861)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Tropidodipsas</i> | <b>8/6</b>              |   |
| <i>T. fasciata</i>                 |                         | (Günther, 1858)   |
| <i>T. fischeri</i>                 |                         | (Boulenger, 1894)   |
| <i>T. guerreroensis</i>            | <b>E</b>                | (Taylor, 1939)  |
| <i>T. papavericola</i>             | <b>E</b>                | (Grünwald, Toribio-Jiménez, Montaño-Ruvalcaba, Franz-Chávez, Peñaloza-Montaño, Barrera-Nava, Jones, Rodriguez, Hughes & Strickland, 2021) |
| <i>T. philippi</i>                 | <b>E</b>                | (Jan, 1863)   |
| <i>T. repleta</i>                  | <b>E</b>                | (Smith, Lemos-Espinal, Hartman & Chiszar, 2005)   |
| <i>T. tricolor</i>                 | <b>E</b>                | (Grünwald, Toribio-Jiménez, Montaño-Ruvalcaba, Franz-Chávez, Peñaloza-Montaño, Barrera-Nava, Jones, Rodriguez, Hughes & Strickland, 2021) |
| <i>T. zweifeli</i>                 | <b>E</b>                | (Liner & Wilson, 1970)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Xenodon</i>       | <b>1/0</b>              |   |
| <i>X. rabdocephalus</i>            |                         | (Wied-Neuwied, 1824)  |
| <b>FAMILIA ELAPIDAE (3)</b>        | <b>15/8</b>             |   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Hydrophis</i>     | <b>1/0</b>              |   |
| <i>H. platurus</i>                 |                         | (Linnaeus, 1766)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Micruroides</i>   | <b>1/0</b>              |   |
| <i>M. euryxanthus</i>              |                         | (Kennicott, 1860)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Micrurus</i>      | <b>13/8</b>             |   |
| <i>M. apiatus</i>                  |                         | (Jan, 1858)   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)        | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                         |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| <i>M. browni</i>                | E                       | (Schmidt & Smith, 1943)                  |
| <i>M. diastema</i>              | E                       | (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)        |
| <i>M. distans</i>               | E                       | (Kennicott, 1860)                        |
| <i>M. elegans</i>               |                         | (Jan, 1858)                              |
| <i>M. ephippifer</i>            | E                       | (Cope, 1886)                             |
| <i>M. laticollaris</i>          | E                       | (Peters, 1869)                           |
| <i>M. latifasciatus</i>         |                         | (Schmidt, 1933)                          |
| <i>M. limbatus</i>              | E                       | (Fraser, 1964)                           |
| <i>M. michoacanensis</i>        | E                       | (Duges, 1891)                            |
| <i>M. nigrocinctus</i>          |                         | (Girard, 1854)                           |
| <i>M. oliveri</i>               | E                       | (Roze, 1967)                             |
| <i>M. tener</i>                 |                         | (Baird & Girard, 1953)                   |
| <b>FAMILIA LEPTOTYPHLOPIDAE</b> | <b>17/10</b>            |  |
| <b>(2)</b>                      |                         |  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Epictia</i>    | <b>7/5</b>              |  |
| <i>E. bakewelli</i>             | E                       | (Oliver, 1937)                           |
| <i>E. magnamaculata</i>         |                         | (Taylor, 1940)                           |
| <i>E. phenops</i>               |                         | (Cope, 1875)                             |
| <i>E. resetari</i>              | E                       | (Wallach, 2016)                          |
| <i>E. schneideri</i>            | E                       | (Wallach, 2016)                          |
| <i>E. vindumi</i>               | E                       | (Wallach, 2016)                          |
| <i>E. wynni</i>                 | E                       | (Wallach, 2016)                          |
| <b>GÉNERO</b> <i>Rena</i>       | <b>10/5</b>             |  |
| <i>R. boettgeri</i>             | E                       | (Werner, 1899)                           |
| <i>R. bressoni</i>              | E                       | (Taylor, 1939)                           |
| <i>R. dissecta</i>              |                         | (Cope, 1896)                             |
| <i>R. dugesii</i>               |                         | (Bocourt, 1881)                          |
| <i>R. dulcis</i>                |                         | (Baird & Girard, 1853)                   |
| <i>R. humilis</i>               |                         | (Baird & Girard, 1853)                   |
| <i>R. iversoni</i>              | E                       | (Smith, Breukelen, Auth & Chiszar, 1998) |
| <i>R. maxima</i>                | E                       | (Loveridge, 1932)                        |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)        | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)           |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <i>R. myopica</i>               | E                       | (Garman, 1884)             |
| <i>R. segregata</i>             |                         | (Klauber, 1939)            |
| <b>FAMILIA LOXOCEMIDAE (1)</b>  | <b>1/0</b>              |                            |
| <b>GÉNERO</b> <i>Loxocemus</i>  | <b>1/0</b>              |                            |
| <i>L. bicolor</i>               |                         | (Cope, 1861)               |
| <b>FAMILIA NATRICIDAE (3)</b>   | <b>33/22</b>            |                            |
| <b>GÉNERO</b> <i>Nerodia</i>    | <b>2/0</b>              |                            |
| <i>N. erythrogaster</i>         |                         | (Forster, 1771)            |
| <i>N. rhombifer</i>             |                         | (Hallowell, 1852)          |
| <b>GÉNERO</b> <i>Storeria</i>   | <b>3/2</b>              |                            |
| <i>S. dekayi</i>                |                         | (Holbrook, 1836)           |
| <i>S. hidalgoensis</i>          | E                       | (Taylor, 1942)             |
| <i>S. storerioides</i>          | E                       | (Cope, 1865)               |
| <b>GÉNERO</b> <i>Thamnophis</i> | <b>28/20</b>            |                            |
| <i>T. bogerti</i>               | E                       | (Rossman & Burbrink, 2005) |
| <i>T. chryscephalus</i>         | E                       | (Cope, 1885)               |
| <i>T. conanti</i>               | E                       | (Rossman & Burbrink, 2005) |
| <i>T. copei</i>                 | E                       | (Dugés & Cope, 1879)       |
| <i>T. cyrtopsis</i>             |                         | (Kennicott, 1860)          |
| <i>T. elegans</i>               |                         | (Baird & Girard, 1853)     |
| <i>T. eques</i>                 |                         | (Reuss, 1834)              |
| <i>T. errans</i>                | E                       | (Smith, 1942)              |
| <i>T. exsul</i>                 | E                       | (Rossman, 1969)            |
| <i>T. foxi</i>                  | E                       | (Rossman & Blaney, 1968)   |
| <i>T. fulvus</i>                |                         | (Bocourt, 1893)            |
| <i>T. godmani</i>               | E                       | (Günther, 1894)            |
| <i>T. hammondii</i>             |                         | (Kennicott, 1860)          |
| <i>T. lineri</i>                | E                       | (Rossman & Burbrink, 2005) |
| <i>T. marcianus</i>             |                         | (Baird & Girard, 1853)     |
| <i>T. melanogaster</i>          | E                       | (Peters, 1864)             |
| <i>T. mendax</i>                | E                       | (Walker, 1955)             |
| <i>T. nigronuchalis</i>         | E                       | (Thompson, 1957)           |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)              | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)                  |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <i>T. postremus</i>                   | E                       | (Smith, 1942)                     |
| <i>T. proximus</i>                    |                         | (Say & James, 1823)               |
| <i>T. pulchrilatus</i>                | E                       | (Cope, 1885)                      |
| <i>T. rossmani</i>                    | E                       | (Conant, 2000)                    |
| <i>T. scalaris</i>                    | E                       | (Cope, 1861)                      |
| <i>T. scaliger</i>                    | E                       | (Jan, 1863)                       |
| <i>T. sirtalis</i>                    |                         | (Linnaeus, 1758)                  |
| <i>T. sumichrasti</i>                 | E                       | (Cope, 1866)                      |
| <i>T. unilabialis</i>                 | E                       | (Tanner, 1985)                    |
| <i>T. validus</i>                     | E                       | (Kennicott, 1860)                 |
| <b>FAMILIA SIBYNOPHIIDAE (1)</b>      | <b>1/0</b>              |                                   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Scaphiodontophis</i> | <b>1/0</b>              |                                   |
| <i>S. annulatus</i>                   |                         | (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) |
| <b>FAMILIA TYPHLOPIDAE (1)</b>        | <b>2/0</b>              |                                   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Amerotyphlops</i>    | <b>2/0</b>              |                                   |
| <i>A. microstomus</i>                 |                         | (Cope, 1866)                      |
| <i>A. tenuis</i>                      |                         | (Salvin, 1860)                    |
| <b>FAMILIA VIPERIDAE (10)</b>         | <b>74/44</b>            |                                   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Akistrodon</i>       | <b>4/1</b>              |                                   |
| <i>A. bilineatus</i>                  |                         | (Günther, 1863)                   |
| <i>A. laticinctus</i>                 |                         | (Gloyd & Conant, 1934)            |
| <i>A. russeolus</i>                   |                         | (Gloyd, 1972)                     |
| <i>A. taylori</i>                     | E                       | (Burger & Robinson, 1951)         |
| <b>GÉNERO</b> <i>Bothriechis</i>      | <b>4/1</b>              |                                   |
| <i>B. aurifer</i>                     |                         | (Salvin, 1860)                    |
| <i>B. bicolor</i>                     |                         | (Bocourt, 1868)                   |
| <i>B. rowleyi</i>                     | E                       | (Bogert, 1968)                    |
| <i>B. schlegeli</i>                   |                         | (Berthold, 1846)                  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Bothrops</i>         | <b>1/0</b>              |                                   |
| <i>B. asper</i>                       |                         | (Garman, 1883)                    |
| <b>GÉNERO</b> <i>Cerrophidion</i>     | <b>3/2</b>              |                                   |
| <i>C. godmani</i>                     |                         | (Günther, 1863)                   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)      | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)   |
|-------------------------------|-------------------------|--|
| <i>C. petlalcalensis</i>      | E                       | (López-Luna, Vogt & De la Torre-Loranca, 1999)   |
| <i>C. tzotzilorum</i>         | E                       | (Campbell, 1985)   |
| <b>GÉNERO <i>Crotalus</i></b> | <b>45/29</b>            |  |
| <i>C. angelensis</i>          | E                       | (Klauber, 1963)  |
| <i>C. aquilus</i>             | E                       | (Klauber, 1952)  |
| <i>C. armstrongi</i>          | E                       | (Campbell, 1979)   |
| <i>C. atrox</i>               |                         | (Baird & Girard, 1853)   |
| <i>C. basiliscus</i>          | E                       | (Cope, 1864)   |
| <i>C. brunneus</i>            | E                       | (Harris & Simmons 1978)  |
| <i>C. campbelli</i>           | E                       | (Bryson, Linkem, Dorcas, Lathrop, Jones, Alvarado-Díaz, Grünwald & Murphy, 2014)         |
| <i>C. catalinensis</i>        | E                       | (Cliff, 1954)  |
| <i>C. cerastes</i>            |                         | (Hallowell, 1854)  |
| <i>C. culminatus</i>          | E                       | (Klauber, 1952)  |
| <i>C. ehecatl</i>             | E                       | (Carabajal-Márquez, Cedeño-Vázquez, Martínez-Arce, Neri-Castro & Machkour-M'rabet, 2020) |
| <i>C. enyo</i>                | E                       | (Cope, 1861)   |
| <i>C. ericsmithi</i>          | E                       | (Campbell & Flores-Villela, 2008)  |
| <i>C. estebanensis</i>        | E                       | (Klauber, 1949)  |
| <i>C. exiguum</i>             | E                       | (Campbell & Armstrong, 1979)   |
| <i>C. helleri</i>             |                         | (Meek, 1905)   |
| <i>C. intermedius</i>         | E                       | (Troschel & Müller, 1865)  |
| <i>C. lannomi</i>             | E                       | (Tanner, 1966)   |
| <i>C. lepidus</i>             |                         | (Kennicott, 1861)  |
| <i>C. lorenzoensis</i>        | E                       | (Radcliff & Maslin, 1975)  |
| <i>C. mictlantecuhtli</i>     | E                       | (Carabajal-Márquez, Cedeño-Vázquez, Martínez-Arce, Neri-Castro & Machkour-M'rabet, 2020) |
| <i>C. mitchellii</i>          |                         | (Cope, 1861)   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)             | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)  |
|--------------------------------------|-------------------------|---|
| <i>C. molossus</i>                   |                         | (Baird & Girard, 1853)  |
| <i>C. morulus</i>                    | E                       | (Klauber, 1952)   |
| <i>C. ornatus</i>                    |                         | (Hallowell, 1854)   |
| <i>C. polisi</i>                     | E                       | (Meik, Schaack, Flores-Villela & Streicher, 2018)                               |
| <i>C. polystictus</i>                | E                       | (Cope, 1865)  |
| <i>C. pricei</i>                     |                         | (Van Denburgh, 1895)  |
| <i>C. pusillus</i>                   | E                       | (Klauber, 1952)   |
| <i>C. pyrrhus</i>                    |                         | (Cope, 1866)  |
| <i>C. ravus</i>                      | E                       | (Cope, 1865)  |
| <i>C. ruber</i>                      |                         | (Cope, 1892)  |
| <i>C. scutulatus</i>                 |                         | (Kennicott, 1861)   |
| <i>C. simus</i>                      |                         | (Latreille, 1801)   |
| <i>C. stejnegeri</i>                 | E                       | (Dunn, 1919)  |
| <i>C. tancitarensis</i>              | E                       | (Alvarado-Díaz & Campbell, 2004)  |
| <i>C. thalassoporos</i>              | E                       | (Meik, Schaack, Flores-Villela & Streicher, 2018)                               |
| <i>C. tigris</i>                     |                         | (Kennicott & Baird, 1859)   |
| <i>C. tlaloci</i>                    | E                       | (Bryson, Linkem, Dorcas, Lathrop, Jones, Alvarado-Díaz, Grünwald, Murphy, 2014) |
| <i>C. totonacus</i>                  | E                       | (Gloyd & Kauffeld, 1940)  |
| <i>C. transversus</i>                | E                       | (Taylor, 1944)  |
| <i>C. triseriatus</i>                | E                       | (Wagler, 1830)  |
| <i>C. tzabcan</i>                    |                         | (Klauber, 1952)   |
| <i>C. viridis</i>                    |                         | (Rafinesque, 1818)  |
| <i>C. willardi</i>                   |                         | (Meek, 1905)  |
| <b>GÉNERO <i>Metlapilcoatlus</i></b> | <b>5/2</b>              |   |
| <i>M. borealis</i>                   | E                       | (Tepos-Ramírez; Flores-Villela; Velasco; Pedraza; García & Jadin, 2021)         |
| <i>M. mexicanus</i>                  |                         | (Dumeril, Bibron & Duméril, 1854)   |

continúa ...

... continuación

| TAXÓN (Familias/Géneros)        | NATIVAS / ENDÉMICAS (E) | (Autoridad, Año)  |
|---------------------------------|-------------------------|---|
| <i>M. nummifer</i>              | E                       | (Rüppell, 1845)   |
| <i>M. occiduus</i>              |                         | (Hoge, 1966)  |
| <i>M. olmec</i>                 |                         | (Pérez-Higareda, Smith & Juliá-Zertuche, 1985)          |
| <b>GÉNERO</b> <i>Mixcoatlus</i> | <b>3/3</b>              |   |
| <i>M. barbouri</i>              | E                       | (Dunn, 1919)  |
| <i>M. browni</i>                | E                       | (Shreve, 1938)  |
| <i>M. melanurus</i>             | E                       | (Müller, 1923)  |
| <b>GÉNERO</b> <i>Ophryacus</i>  | <b>3/3</b>              |   |
| <i>O. smaragdinus</i>           | E                       | (Grünwald, Jones, Franz-Chávez & Ahumada-Carillo, 2015) |
| <i>O. sphenophrys</i>           | E                       | (Smith, 1960)   |
| <i>O. undulatus</i>             | E                       | (Jan, 1859)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Porthidium</i> | <b>5/3</b>              |   |
| <i>P. dunni</i>                 | E                       | (Hartweg & Oliver, 1938)                                |
| <i>P. hespere</i>               | E                       | (Campbell, 1976)  |
| <i>P. nasutum</i>               |                         | (Bocourt, 1868)   |
| <i>P. ophryomegas</i>           |                         | (Bocourt, 1868)   |
| <i>P. yucatanicum</i>           | E                       | (Smith, 1941)   |
| <b>GÉNERO</b> <i>Sistrurus</i>  | <b>1/0</b>              |   |
| <i>S. tergeminus</i>            |                         | (Say, 1823)   |